

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนภูมิภาค		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เตือนการระบาด	๑. เกษตรจังหวัดนครพนม เตือนภัยโรคตายพรายในกล้วย ภัยร้ายถึงตาย พร้อมแนะวิธีป้องกันลดการระบาดในแปลง	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เตือนการระบาด	๒. เกษตรจังหวัดนครพนม แจ้งเตือนพี่น้องชาวนา!! ฝ้าระวังการระบาดหนอนกระทู้กล้าข้าว	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
แปลงใหญ่ทุเรียน	๓. แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ตาชี เร่งพัฒนาคุณภาพทุเรียนชายแดน มาตรฐาน GAP สร้างรายได้มั่นคงสู่เกษตรกร	สยามรัฐออนไลน์

เกษตรกรจังหวัดนครพนม เตือนภัยโรคตายพรายในกล้วย ภัยร้ายถึงตาย พร้อมแนะวิธีป้องกันลดการระบาดของในแปลง

01 ก.ค. 2565 Views 55



นางสาวกัญญา อภินันท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กล้วย เป็นพืชที่ช่วยสร้างรายได้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ด้วยสรรพคุณทางโภชนาการที่เปี่ยมล้น นำมากินแบบสดๆ ก็อร่อย นำไปแปรรูปก็ดีเลิศ ทำให้กล้วยเป็นพืชที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไป ด้วยรสชาติและการเจริญเติบโตให้ผลผลิตเร็ว แต่กล้วยเองก็มีโรคประจำตัว คือ โรคตายพรายกล้วย ที่ทำให้ต้นกล้วยตายและผลผลิตลดลง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลผลิตที่น้อยลงตามไปด้วย

“โรคกล้วยตายพราย” จะพบในกล้วยอายุประมาณ ๔ - ๕ เดือนขึ้นไปเกือบทุกชนิด โดยในช่วงแรกควรหมั่นสังเกตตามก้านของใบ ซึ่งจะมีสีเหลืองอ่อนของใบแก่ ต่อมา เชื้อราจะลุกลามไปยังขอบใบและจะเหลืองทั้งใบ หากป้องกันไม่ทันเชื้อราจะสามารถเข้าทำลายโดยเข้าสู่ลำต้นและลุกลามเข้าสู่ก้านใบ โคนใบแก่จะมีสีเหลืองซีด ในที่สุดลำต้นจะยืนต้นตายหรือล้มตาย โดยเกิดจากเชื้อรา *Fusarium oxysporum f.sp.Cubense* ซึ่งจะเข้าทำลายระบบรากและเจริญเข้าไปในท่อน้ำ ท่ออาหาร ทำให้เกิดการอุดตัน ส่งผลให้ใบมีอาการขาดน้ำ เหี่ยวเฉา และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หักพับ ชะงักการเจริญ และตายในที่สุด และจะเกิดการระบาดไปทางดิน และสำหรับต้นกล้วยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะถูกโรคเข้าทำลายและลุกลามอย่างรวดเร็ว จึงควรทำความสะอาดโคนกอกล้วย และทำทางระบายน้ำให้ดี ลักษณะอาการ ต้นกล้วยจะเห็นทางสีเหลืองอ่อนตามก้านใบของใบล่างหรือใบแก่ก่อน ต่อมาปลายใบหรือขอบใบจะเริ่มเหลือง และขยายออกไปอย่างรวดเร็วจนเหลืองทั้งใบ ซึ่งใบอ่อนจะมีการเหลืองไหม้หรือตายนิ่งและบิดเป็นคลื่น ใบกล้วยจะหักพับบริเวณโคนก้าน ใบ ใบยอดจะเหลืองตั้งตรงเขียวอยู่ในระยะแรก ต่อมาก็ตายไปเช่นกัน และในส่วนของกล้วยที่ตกเครือแล้วจะเหี่ยว ผลลีบเล็กไม่สม่ำเสมอ หรือแก่ก่อนกำหนด เนื้อฟ้ามืด บางครั้งพบใบกล้วยหักพับที่โคนใบโดยไม่แสดงอาการใบเหลือง หรือเหลืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าตัดลำต้นตามขวางจะพบว่าเนื้อในของกาบใบบางส่วนเป็นสีน้ำตาลแดง พบมากในไส้กลางของกล้วย โดยอาการนี้จะขยายไปยังกาบ ใบ และลุกลามไป

ที่เครือ ผลกล้วย มีเส้นใยของเชื้อราได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า วิธีป้องกันโรคตายพราย ที่ได้ผลดีคือ ก่อนปลูก ขุดหน่อพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา รองกันหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่คลุกกับ เชื้อราไตรโคเดอร์มา และใช้ไตรโคเดอร์มา ราดโคนต้น ควรทำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และหมั่นตัดแต่งใบกล้วยเมื่อมีโอกาส กรณีกล้วยเป็นโรค ให้ขุดเหง้า ขึ้นมาเผาทำลายแล้วโรยพื้นดินบริเวณด้วยปูนขาว ๑-๒ กก./หลุม และทำความสะอาดแปลงปลูกและ เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรอยู่เสมอ เนื่องจากเชื้อชนิดนี้ลามได้ง่าย ทั้งระยะพื้นที่นั้นๆ เป็นเวลา ๒ - ๓ เดือน เพื่อดินบริเวณดังกล่าวจะปลอดเชื้อ การควบคุมโรคตายพราย ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปลอดโรค ทำลายต้นกล้วย ที่เป็นโรค ห้ามขุดย้ายหน่อที่เป็นโรคไปปลูก ทำความสะอาดเครื่องมือ สำหรับในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกไม่ควร มีน้ำท่วมขัง เพราะจะทำให้กล้วยน้ำว้าอ่อนแอและเกิดโรคได้ง่าย และเพื่อไม่ให้น้ำไหลผ่านจากต้นกล้วยที่เป็น โรคไปสู่ต้นกล้วยปกติ ควรทำให้พื้นที่เพาะปลูกระบายน้ำได้ดี หมั่นสังเกตที่กล้วยว่ามีอาการของโรคตาย พรายที่กล่าวไปข้างต้นหรือไม่ มีการโรยปูนขาวบริเวณเพาะปลูก ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร อยู่เสมอ เพราะเชื้อชนิดนี้ลุกลามได้ง่าย และควรทิ้งระยะพื้นที่นั้นๆ เป็นเวลา ๒-๓ เดือน ควรทำลายต้นกล้วย ที่เกิดโรคตายพรายในทันทีและห้ามขุดย้ายหน่อต้นที่เป็นโรคไปปลูกโดยเด็ดขาด



NNT

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

สังคม

เกษตรกรจังหวัดนครพนม แจ้งเตือนพี่น้องชาวนา!! เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้กล้าข้าว

01 ก.ค. 2565



Views 28



นางสาวกัญญา อภินันท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การระบาดของหนอนกระทู้กล้าข้าว ซึ่งเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนปีกคู่หน้าสีเทาปนน้ำตาล ความกว้างของปีกกางออกประมาณ ๓.๕ - ๔ เซนติเมตร ปีกคู่หลังสีขาว บินเก่งสามารถอพยพได้ไกลเป็นระยะทางหลายสิบหรือหลายร้อยกิโลเมตร วางไข่เป็นกลุ่ม บริเวณยอดอ่อนของข้าว ตัวหนอนมีสีเทาถึงเขียวแกมดำ ด้านหลังมีลายตามความยาวของลำตัวจากหัวจรดท้าย แต่ละปล้องมีจุดสีดำ ตัวหนอนฟักจากไข่ช่วงเช้าตรู่ และรวมกลุ่มกันกัดกินส่วนปลายใบข้าว กลางวันจะหลบอยู่ในดินใต้เศษใบพืช ในพื้นที่ที่แห้ง บางส่วนอยู่บนต้นข้าวส่วนที่อยู่เหนือน้ำในนาที่ลุ่ม ชอบเข้าดักแด้ในดิน หรือบนต้นหญ้าตามขอบแปลง ตัวหนอนโตเต็มที่ ยาวประมาณ ๓.๕ - ๔ มิลลิเมตร กว้าง ๕ - ๖ มิลลิเมตร ซึ่งวัฏจักรจะแตกต่างกันตามพื้นที่ระบาด ลักษณะการทำลายและการระบาด โดยทั่วไปหนอนจะทำลายข้าวในเวลากลางคืนหนอนระยะแรกจะกัดกินผิวข้าวเมื่อโตขึ้นจะกัดกินกัดกินทั้งใบ และต้นข้าวเหลือไว้แต่ก้านใบตัวหนอนจะกัดกินต้นกล้าระดับพื้นดินนาข้าวจะถูกทำลายแห้งเป็นหย่อมๆและอาจเสียหายได้ภายใน ๑-๒ วัน ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หนอนมีการเคลื่อนย้ายเป็นกลุ่มคล้ายกองทัพ จากการขยายพันธุ์หลายๆ รุ่นบนวัชพืชพวกหญ้า และเคลื่อนเข้าสู่แปลงกล้าและนาข้าวจากแปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่ง มักพบระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะหลังจากผ่านช่วงแล้งที่ยาวนาน แล้วตามด้วยฝนตกหนัก การระบาดจะรุนแรงเป็นบางปี บางพื้นที่ฝากถึงพี่น้องชาวนา ให้หมั่นออกสำรวจแปลงนาทุกระยะ การป้องกันกำจัด ให้กำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัย ใช้สารฆ่าแมลงมาลาไธออน (มาลาไธออน ๘๓% อีซี) อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือเฟนิโตรไธออน (ซูมิไธออน ๕๐% อีซี) อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่น เมื่อพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ขอให้เกษตรกร ชาวนา ประสานงานกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือ เกษตรตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอ ไกล่บ้านท่าน

แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ตาชี เร่งพัฒนาคุณภาพทุเรียนชายแดน มาตรฐาน GAP สร้างรายได้มั่นคงสู่เกษตรกร

สยามรัฐออนไลน์ 1 กรกฎาคม 2565 12:22 น. เกษตร



พื้นที่อำเภอยะหา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีภูเขาล้อมรอบ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก มีน้ำจากน้ำตกไหลผ่านหมู่บ้าน ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี ลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชาชนมีอาชีพทำสวนยาง และสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อปี ๒๕๖๑ ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะ สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา ให้มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตาชี ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด จำนวน ๔๔ ราย พื้นที่การปลูกจำนวน ๒๖๙ ไร่ ผลผลิตที่ได้ทั้งหมด ๓๒๖ ตัน ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน ๔๒ ราย

นายอนุชา จูวัต เกษตรอำเภอยะหา จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา ได้สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งมีการวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรกรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ในการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในการจัดการส่งเสริมตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน กลุ่มให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกคน โดยจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงปัญหา และร่วมกันแก้ไข มีการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสวนทุเรียน โดยมีแปลงต้นแบบของประธานกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ สวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้าใจ ความสามัคคีภายในกลุ่ม และทางกลุ่มได้กำหนด ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของกลุ่มด้วย กลุ่มได้มีการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง ๒ เครือข่ายให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดงาน ถ่ายทอดความรู้เพื่อ

เริ่มต้นฤดูกาลผลิต Field Day ปี ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ทางกลุ่มมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยตั้งเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน ๕ ด้าน ๑. การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ร้อยละ ๖๐ มีการลดต้นทุนการผลิต ได้มากกว่าร้อยละ ๒๐ จากการนำความรู้ด้านพืชไปใช้ในแปลงของตนเอง ด้านพืชโดยการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตรงตามระยะการพัฒนาของพืชในปริมาณที่พืชต้องการ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรของ พด.ได้เอง เพื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ใช้สารสกัดชีวภาพป้องกัน กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น สารสะเดา เชื้อราไตรโคเดอร์มา ๒. การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ร้อยละ ๖๐ สามารถผลิตสินค้าได้ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒๐ จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งการผลิตพืช โดยเฉพาะเรื่องการจัดการสวน ที่ดี การดูแลรักษาตามปฏิทินการผลิตพืช ใช้ปุ๋ยถูกต้องเหมาะสม การปรับปรุงระบบน้ำให้สามารถใช้ได้ตลอด ฤดูกาลผลิต การจัดการโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสาน สมาชิกสามารถนำกลับไปปฏิบัติได้จริง ข้อมูลในระบบ <https://cofarm.doae.go.th> แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตาชีอำเภอยะหา ๓. การพัฒนาคุณภาพ สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตาชี ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร GAP ครบทุกราย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ของเกษตรกรทุกราย เกษตรกรผ่านการอบรมและผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อขอรับรองแปลง GAP ทุเรียนครบทุกราย การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า โดยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และให้การสนับสนุน ปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า ทำให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถ รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งตลาดออนไลน์ Facebook ล้ง พ่อค้าในพื้นที่โรงงาน พ่อค้าคนกลาง สกต. วิสาหกิจชุมชน มีแบรนด์ มีกล่องบรรจุสินค้า และมีการแปรรูปสินค้าทุเรียนเป็นทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนเชื่อม ๔. การตลาด สามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งตลาดผู้บริโภคโดยตรง และศูนย์คัดแยก ไม้ผล โดยกลุ่มสามารถกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มที่ชัดเจน และ ๕. การบริหารจัดการ มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็งมีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตาชี” โดยประธานแปลงใหญ่และคณะกรรมการมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) นายอนุชา จูวัด กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มแปลงใหญ่ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ โดยการยกโคกปลูกทุเรียน เพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าจากฝนที่ตกลงมา อาจนำเชื้อโรครากเน่าโคนเน่า ไหลมากับน้ำมายังโคนต้นทุเรียน จึงยกโคกเพื่อไม่ให้น้ำมาท่วมขังบริเวณต้นทุเรียน ได้จัดทำระบบน้ำอัจฉริยะ (Handy Sense) ซึ่งน้ำและสภาพอากาศ เป็นปัจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหล่งน้ำต้องดี ปริมาณน้ำต้องมาก พอ เพราะทุเรียนขาดน้ำไม่ได้ในทุกๆระยะ โดยเฉพาะช่วงติดดอกติดผล การได้ทดลองใช้เทคโนโลยีระบบ ควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติฯ ซึ่งใช้ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดค่าความชื้นในดิน ความชื้นอากาศ แสดงค่าตัวเลข เพื่อการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะการให้น้ำตามความต้องการของต้นทุเรียน ในช่วงเจริญเติบโต ช่วงติดดอก และช่วงติดผล ช่วยลดปัญหาการให้น้ำที่มากเกินไป ลดต้นทุนแรงงาน และควบคุมผลผลิตไม้ผล ให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มช่องทาง และโอกาสทางการค้า ผ่านระบบ e-commerce การเพิ่มช่องทางการบริโภคทุเรียนโดยตรงจากสวนสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับประทานทุเรียนคุณภาพที่เจ้าของสวนเลือกเองกับมือ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line ทำให้สมาชิกสามารถจำหน่ายทุเรียนในราคาที่สูงขึ้น รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตอีกด้วย