

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แปลงใหญ่ลำไย	๑. โชว์ความสำเร็จแปลงใหญ่ลำไย ตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	Facebook SpringNews
แปลงใหญ่ลำไย	๒. เกษตรแนะนำ ออนไลน์ขายลำไย ส่งลำไย แปลงใหญ่ขัวมุงขายดี	Facebook ควายดำทำเกษตร
โรคใบด่างมันสำปะหลัง	๓. กรมส่งเสริมการเกษตร รุกเข้มรณรงค์ควบคุม โรคใบด่างมันสำปะหลัง	สยามรัฐออนไลน์
ส่วนภูมิภาค		
โรคขอบใบแห้ง-ใบขีด สีส้มในข้าว	๔. เตือนชาวนา! ระวังโรคขอบใบแห้ง-ใบขีดสีส้ม ในนาข้าว หวั่นกระทบผลผลิต	เดลินิวส์ออนไลน์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0๒mdqZ๖๒๒vaDbVpTbv๕VdXqCzzCe๖bse๙VWPPbc๕๕๓RBuh๓ZNYVNw๙KsrUWsm๔Usbl&id=๓๐๗๕๑๓๓๔๕๘๔๐



SpringNews

September 12 at 4:15 PM · 🌐

...

แปลงใหญ่ลำไยตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ประกาศปิดตลาดการขายลำไยจากกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลขัวมุง ลือล่ำสุดเพิ่งหมดไปภายในเวลาอันรวดเร็วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การใช้สื่อโซเชียลกลายเป็นอีกหนทาง ที่ช่วยส่งต่อผลผลิตลำไยของที่นี่ ไปยังลูกค้าทั่วประเทศ และหลายคนยังสั่งซื้อทุกปี จนกลายเป็นลูกค้าประจำกันไปแล้ว

ความสำเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลขัวมุง อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ทำให้ต้องสืบเสาะหาที่มาที่ไป เพราะอะไรกลุ่มเกษตรกรถึงประสบความสำเร็จ มีหน่วยงานไหนให้การสนับสนุนบ้าง

นายเสน่ห์ ทะพิงค์แดก ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลขัวมุง ได้เล่าให้ฟังว่า พื้นที่ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกลำไย (S1) เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนลำไย และตำบลขัวมุง มีพื้นที่ปลูกลำไยมากเป็นลำดับสองของอำเภอ เกษตรกรตำบลขัวมุงมีรายได้หลักจากการจำหน่ายผลผลิตลำไย แต่ในบางฤดูกาลผลผลิตลำไยเกษตรกรประสบปัญหาหลายด้าน ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาการขาดแคลนแรงงานสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่สำคัญปัญหาราคาลำไยตกต่ำ การจำหน่ายผลผลิตลำไยของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายแบบ รูดร่วง ทำให้เกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาในการผลิตและการจำหน่าย

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีนโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยตำบลขัวมุง จึงได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกร และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยรวบรวมเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจำนวน 139 ราย พื้นที่ 390 ไร่ ขอจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลขัวมุง แปลงปี 2559 ซึ่งเป็นแปลงแรกของอำเภอสารภี

ต่อมาได้จัดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตำบลขัวมุง มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการวางแผนการผลิต และมีการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทางกลุ่มได้รับโอกาสและช่องทางการจำหน่ายผลผลิตจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี และบริษัทห่อป๋ขุเปอรมาเกิด จำกัด ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจำหน่ายแบบพันธสัญญาโดยวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขัวมุง จำนวนผลผลิตลำไยสด 100,000 กิโลกรัม/ปี จากจำนวนลำไยที่ผลิตได้ 331,500 กิโลกรัมต่อปี

ปัจจุบัน กลุ่มได้ผลผลิตลำไยคุณภาพ มีมาตรฐาน GAP ทุกแปลง มีตลาดรองรับชัดเจน โดยทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เชียงใหม่ ส่งเข้าห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาดออนไลน์ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค “แปลงใหญ่ลำไยตำบลขัวมุง”

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวถึงกลุ่มลำไยแปลงใหญ่ตำบลขัวมุงว่า เป็นแปลงใหญ่ต้นแบบของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานบูรณาการต่างๆ ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในด้านการงบประมาณ , การถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตจนถึงการตลาด,แบรนด์สินค้า สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การผลิตสารชีวภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด MOU สนับสนุนการแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และเป็นหน่วยงานประสานการบูรณาการกับทุกหน่วยงาน จึงทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านการลดต้นทุน 25 % , การเพิ่มผลผลิต 25 % , มาตรฐานการผลิต GAP,

นอกจากนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรยังมุ่งส่งเสริมเกษตรกรทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตส่วนบุคคล มีการวางแผนการผลิต การลดต้นทุนโดยการตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยหมัก การใช้สารชีวภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การทำลำไยคุณภาพ เกรต AA เน้นการผลิตโดยลดน้ำการผลิต ,ทำให้เกษตรกรมีความพึงพอใจในราคาได้เพิ่มขึ้น ,เข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี ,แหล่งเงินทุน

ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่ม (ลำไยแปลงใหญ่) รวมผลิต ,รวมซื้อ ,รวมขาย อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นกลุ่มตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไปในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษางานด้านการเกษตรแปลงใหญ่โดยเฉพาะด้านไม้ผล ลำไย

ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการแบบแปลงใหญ่นำการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเตรียมดิน เช่น การใช้ใบลำไยคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นและลดการเผาในพื้นที่การเกษตร การผลิตมาตรฐาน GAP เป็นการผลิตที่เน้นการรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง มีการพัฒนาแปลงใหญ่โดยเน้นการตลาดนำการผลิต กลุ่มและสมาชิกได้รับผลตอบแทนและมีความพึงพอใจทำให้เกิดความศรัทธาในระบบแปลงใหญ่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาแปลงใหญ่ต่อไป



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid๐๗B๑C๑MatYxxTASHH๒Z๑TPsLgtURisk๖qj
Ci๕๓๒vd๑๒C๑RNAAHCTmPDSWcCtqLpiN&id=๓๖๕๒๙๕๕๔๐๔๘๗๓๕๓



ควายดำท่าเกษร

September 12 at 5:29 PM ·

...

แปลงใหญ่ลำไยตามลขั้วมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ประกาศปิดล้อมการขายลำไยจากกลุ่มแปลงใหญ่ตามลขั้วมุง ล้อมล้งสุดเพ็งหมดไปภายในเวลาอันรวดเร็วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การใช้สื่อโซเชียลกลายเป็นอีกหนทาง ที่ช่วยส่งต่อผลผลิตลำไยของที่นี่ ไปยังลูกค้าทั่วประเทศ และหลายคนยังสั่งซื้อทุกปี จนกลายเป็นลูกค้าประจำกันไปแล้ว

ความสำเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่ตามลขั้วมุง อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ทำให้ต้องสืบเสาะหาที่มาที่ไป เพราะอะไรกลุ่มเกษตรกรถึงประสบความสำเร็จ มีหน่วยงานไหนให้การสนับสนุนบ้าง

นายเสน่ห์ ทะพิงค์ เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตามลขั้วมุง ได้เล่าให้ฟังว่า พื้นที่ตามลขั้วมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกลำไย (S1) เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนลำไย และตามลขั้วมุง มีพื้นที่ปลูกลำไยมากเป็นลำดับสองของอำเภอ เกษตรกรตามลขั้วมุงมีรายได้หลักจากการจำหน่ายผลผลิตลำไย แต่ในบางฤดูกาลผลผลิตลำไยเกษตรกรประสบปัญหาหลายด้าน ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาการขาดแคลนแรงงานสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่สำคัญปัญหาราคาลำไยตกต่ำ การจำหน่ายผลผลิตลำไยของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายแบบ รูดร่วง ทำให้เกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาในการผลิตและการจำหน่าย

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีนโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรปลูกลำไยตามลขั้วมุง จึงได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกร และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยรวบรวมเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจำนวน 139 ราย พื้นที่ 390 ไร่ ขอจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตามลขั้วมุง แปลงปี 2559 ซึ่งเป็นแปลงแรกของอำเภอสารภี

ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตามลขั้วมุง มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการวางแผนการผลิต และมีการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทางกลุ่มได้รับโอกาสและช่องทางการจำหน่ายผลผลิตจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี และบริษัทห่อปชูปเปอร์มาเก็ด จำกัด ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจำหน่ายแบบพันธสัญญาโดยวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตามลขั้วมุง จำนวนผลผลิตลำไยสด 100,000 กิโลกรัม/ปี จากจำนวนลำไยที่ผลิตได้ 331,500 กิโลกรัมต่อปี

ปัจจุบัน กลุ่มได้ผลผลิตลำไยคุณภาพ มีมาตรฐาน GAP ทุกแปลง มีตลาดรองรับชัดเจน โดยทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เชียงใหม่ ส่งเข้าห้างท็อปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดออนไลน์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก "แปลงใหญ่ลำไยตามลขั้วมุง"

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวถึงกลุ่มลำไยแปลงใหญ่ตามลขั้วมุงว่า เป็นแปลงใหญ่ต้นแบบของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานบูรณาการต่างๆ ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในด้านงบประมาณ , การถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตจนถึงการตลาด,แบรนด์สินค้า สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การผลิตสารชีวภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด MOU สนับสนุนการแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และเป็นหน่วยงานประสานการบูรณาการกับทุกหน่วยงาน จึงทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านการลดต้นทุน 25 % , การเพิ่มผลผลิต 25 % , มาตรฐานการผลิต GAP,

นอกจากนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรยังมุ่งส่งเสริมเกษตรกรทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรสามารถทำแผนการผลิตส่วนบุคคล มีการวางแผนการผลิต การลดต้นทุนโดยการตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยหมัก การใช้สารชีวภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การทำลำไยคุณภาพ เกเรด AA เน้นการผลิตโดยตลาดนำการผลิต , ทำให้เกษตรกรมีความพึงพอใจในราคาได้เพิ่มขึ้น , เข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี , แหล่งเงินทุน

ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่ม (ลำไยแปลงใหญ่) รวมผลิต , รวมซื้อ , รวมขาย อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นกลุ่มตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไปในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการเกษตรแปลงใหญ่โดยเฉพาะด้านไม้ผล ลำไย

ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการแบบแปลงใหญ่เน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเตรียมดิน เช่น การใช้ใบลำไยคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นและลดการเผาในพื้นที่เกษตร การผลิตมาตรฐาน GAP เป็นการผลิตที่เน้นการรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ความยั่งยืนของแปลงใหญ่ การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง มีการพัฒนาแปลงใหญ่โดยเน้นการตลาดนำการผลิต กลุ่มและสมาชิกได้รับผลตอบแทนและมีความพึงพอใจทำให้เกิดความศรัทธาในระบบแปลงใหญ่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาแปลงใหญ่ต่อไป



กรมส่งเสริมการเกษตร รุกเข้มรณรงค์ควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง

📷 📺 📱

สยามรัฐออนไลน์ 13 กันยายน 2565 10:43 น. ประชาสัมพันธ์



กรมส่งเสริมการเกษตร รุกเข้มรณรงค์ควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง ย้ำขอความร่วมมือเกษตรกร ติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของแมลงเพลี้ยอย่างสม่ำเสมอ

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ เกษตรกรมีการปลูกหมุนเวียนต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากการนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูก และมีแมลงหีวขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรค กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดมาตรการสร้างการรับรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ๑) มาตรการสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้รับทราบและตระหนักรู้เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรค ผลกระทบที่เกิดจากการระบาด และแนวทางการป้องกันกำจัด เพื่อเตรียมเฝ้าระวังการเกิดการระบาดของโรค และรับมือกรณีเกิดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ๒) มาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นในพื้นที่ โดยการสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรใช้พันธุ์ทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น ระยะเวลา ๗๒ เกษตรศาสตร์ ๕๐ หัวยอบ ๖๐ ๓) มาตรการควบคุม เพื่อป้องกันการระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง โดยการทำลายต้นเป็นโรคเมื่อพบการระบาด และใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อควบคุมและจำกัดพื้นที่การระบาดของศัตรูพืช ๔) มาตรการให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดความเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ๕) มาตรการวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการในระยะยาว ซึ่งหน่วยงานวิจัยจะศึกษาในเรื่องพันธุ์ต้านทาน หรือการปรับสภาพแวดล้อม

เพื่อลดการระบาดของโรค และ ๖) มาตรการติดตามและประเมินผล เพื่อการปรับแก้ในส่วนที่ยังเป็นปัญหา และอุปสรรคได้ทันท่วงที เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

“มาตรการเหล่านี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมการระบาดของโรค ซึ่งจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพได้หรือไม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการ ร่วมมือกันในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยนำความรู้ และแนวทางการจัดการต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้เกิดความตระหนักในการติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ ปลูกอื่น ๆ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ๓,๐๓๐,๕๙๙ ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน ๕๐๖,๐๕๕ ไร่ นับเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด สามารถสร้างมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี แต่จาก ข้อมูลการรายงานตามระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า มีพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างมัน สำปะหลังในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๔,๓๖๖ ไร่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้มีการแจ้งเตือนภัย การประชาสัมพันธ์ การแนะนำส่งเสริม การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ เกษตรกร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น รวมทั้งการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง และ จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดการงานรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน ๑๒๐ คน เพื่อสร้างการรับรู้ ให้กับเกษตรกรในเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดความ ตระหนักในการติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูกตนเองอย่าง สม่าเสมอ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น ๆ อันจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้แก่ เกษตรกรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เตือนชาวนา! ระวังโรคขอบใบแห้ง-ใบขีดสีส้มในนาข้าว หวั่นกระทบผลผลิต

เกษตรจังหวัดนครพนม เตือนชาวนาเฝ้าระวังโรคขอบใบแห้ง ใบขีดสีส้มในนาข้าว หวั่นกระทบผลผลิต รายได้เกษตรกร แะป้องกันด้วยวิธีผสมผสาน

14 กันยายน 2565 12:35 น. ๖ ท้องถิ่น



น.ส.กัญญา อภินันท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้รับแจ้งข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ บ้านต้นผึ้ง ต.นาแก อ.นาแก พบต้นข้าวในแปลงนามีปัญหาต้นข้าว ใบแห้งตาย ในพื้นที่ ๒๐ ไร่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ๑๐ ราย จึงรีบดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอนาแก และได้มีการประสานมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้คำแนะนำรวมทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นายภานุมาส สิงหะวาระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอนาแกอย่างเร่งด่วน โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงนาข้าวของเกษตรกร พบว่า เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศที่สูงเหมาะกับการระบาดของโรคดังกล่าว และมักเกิดในช่วงระยะแตกกอของต้นข้าว โดยสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Xanthomonas oryzae* pv. *Oryzae*

สำหรับอาการของโรคนี้พบได้ตั้งแต่ระยะกล้า แตกกอ จนถึงออกรวง มีลักษณะข้าวที่ขอบใบของใบล่างต่อมาประมาณ ๗-๑๐ วัน จุดข้านี้จะขยายกลายเป็นทางสีเหลืองยาวตามใบข้าว ขอบแผลมีลักษณะเป็นขอบลายหยัก ใบที่เป็นโรคจะแห้งเร็ว แผลอาจมีหยดน้ำสีครีมคล้ายยางสนกลมๆ ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด หลุดไปตามน้ำหรือฝน ซึ่งจะทำให้โรคสามารถระบาดต่อไปได้ แผลจะขยายไปตามความยาวของใบ บางครั้งขยายเข้าไปข้างในตามความกว้างของใบ ในบางกรณีที่มีเชื้อมีปริมาณสูงเข้าทำลายทำให้ท่อน้ำท่ออาหารอุดตัน ต้นข้าวทั้งต้นจะเหี่ยวเฉาและตายโดยรวดเร็ว เรียกอาการของโรคนี้ว่า ศรีสะเก

โรคใบสีส้ม เกิดจากเชื้อไวรัส Rice Tungro Bacilliform Virus (RTBV) และ Rice Tungro Spherical Virus (RTSV) มีสาเหตุมาจากไวรัส ๒ ชนิดคือ ชนิดอนุภาครูปทรงกลม (RTSV) และชนิดอนุภาครูปท่อนปลายมน (RTBV) โดยมีเพลี้ยจักจั่นสีเขียวเป็นแมลงพาหะ สามารถเกิดได้ในทุกระยะของต้นข้าว ตั้งแต่ต้นกล้าแตกกอ ตั้งท้อง ออกรวง หากเกิดในระยะต้นกล้าจะทำให้ข้าวได้รับความเสียหายมาก เนื่องจากข้าวจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ต้นข้าวไม่สามารถหาอาหารได้ ทำให้ต้นกล้าชะงักและไม่เจริญเติบโต โดยหลังจากที่ต้นข้าวได้รับเชื้อ ๑๕-๒๐ วัน ข้าวจะเริ่มแสดงอาการของโรค ลักษณะที่จะเห็นได้ชัดคือ เริ่มแรกจะเห็นเป็นขีดข้าวยาวไปตามเส้นใบ ต่อมาใบของต้นข้าวจะเริ่มเหลือง และเป็นสีส้มตั้งแต่ปลายใบเข้าไปหาโคนใบ กาบใบและลำต้น หากได้รับเชื้อรุนแรงในระยะต้นกล้า ต้นกล้าสามารถตายลงได้ทั้งกอ แต่หากได้รับเชื้อในระยะตั้งท้องหรือออกรวง จะส่งผลให้ข้าวไม่ออกรวง ออกรวงเล็ก หรืออาจจะออกรวงแต่ข้าวกว่าปกติ และนอกจากนี้ลำต้นของต้นข้าวก็จะมีลักษณะแคะแกร็น ลำต้นสั้นกว่าปกติ ทั้งนี้ผลของโรคหรือความรุนแรงที่ได้รับจากเชื้อขึ้นอยู่กับความต้านทานของพันธุ์ข้าวที่เราเลือกนำมาปลูกด้วยเช่นกัน ลักษณะการแพร่ระบาด จะมีดังนี้ เพลี้ยจักจั่นสีเขียวอพยพเข้าแปลงข้าวทันทีหลังจากเป็นต้นกล้า มีปริมาณมากที่สุดในช่วงการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและลำต้นข้าว ทำให้ข้าวชะงักการเจริญเติบโตและอาจแห้งตายได้ถ้ามีปริมาณมาก การปลูกข้าวหนึ่งครั้ง เพลี้ยจักจั่นสามารถดำรงชีวิตได้ ๓ - ๔ ชั่วอายุ ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนจะแพร่กระจายออกไปไม่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การป้องกันกำจัดโรค สำหรับการป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้ง และใบขีดสีส้มในข้าว สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้หลักการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM) ได้แก่ ๑. วิธีกล (Mechanical control) เช่น การห่อผล การดักจับทำลายการใช้พลาสติก/ตอมติงคลุมแปลง กับดักเหยื่อล่อ/กาบเหนียว การใช้มุ้งตาข่าย ๒. วิธีกายภาพ (Physical control) เช่น การใช้แดดในการตากเมล็ดพันธุ์ การใช้รังสีกำจัดแมลงวันทอง การใช้แสงไฟหลอดสีน้ำเงิน - ดำล่อแมลงศัตรู ๓. วิธีเขตกรรม (Cultural control) เช่น การรวบรวมส่วนของพืชที่ถูกศัตรูพืชทำลายเผา การปลูกพืชสลับพืชหมุนเวียนการปลูกพืชหลายชนิดและหมุนเวียน ๔. ใช้พันธุ์ต้านทาน (Pest Resistance control) เพื่อต้านทานโรคและแมลงต่างๆ ๕. ชีววิธี (Biological control) วิธีการทางชีววิธีเป็นวิธีการใช้ศัตรูธรรมชาติให้ควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยหลักการสมดุลธรรมชาติวิธีการนี้ใช้ได้ผลในการควบคุมแมลงศัตรู โรคพืชและวัชพืชบางชนิด เช่น การใช้ตัวห้ำ (Predators) ๖. ใช้สารสกัดธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช (Plant Natural Extracts M. control) พืชสมุนไพรหลายชนิดมีคุณสมบัติควบคุม/กำจัด/ไล่แมลงศัตรูพืช และกำจัดโรคพืชได้ เช่น สะเดา ข่า เสี้ยน ขมิ้นชัน บอระเพ็ด สาบเสือ หนอนตายหยาก หางไหล (โล่ตื้น) ตะไคร้หอม ลูกตะโก ใบยูคาลิปตัส หัวไพรใบมะรุม ฯลฯ ๗. ใช้กฎหมาย (Legal control) เช่นการกักกันพืช การนำเข้าศัตรูธรรมชาติ ประกาศกระทรวงฯ (พืช พาหะเป็นสิ่งต้องห้าม) ๘. ใช้สารเคมี (Chemical control) เป็นวิธีการสุดท้ายของการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM) เช่น การใช้สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ฯลฯ เพราะการใช้สารเคมีมีผลกระทบข้างเคียงทางลบมากมาย นอกจากนี้ การป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้ง และใบขีดสีส้มในข้าว เกษตรกรยังสามารถทำได้โดยการใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทาน เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี ๖๐ สุพรรณบุรี ๙๐ สุพรรณบุรี ๑ สุพรรณบุรี ๒ และกข ๒๓ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับลำต้น ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่ควรระบายน้ำจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่น ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคโดยเฉพาะถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ขาว

ดอกมะลิ ๑๐๕ กข ๖ เหนียวสันป่าตอง พืชญโลก ๒ และถ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีแนะนำให้ใช้ สารเซตัสโพ-
 มัยซินซิลแพต+ออกซีเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ (แคนเกอร์เอ็กซ์) หรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์(ฟิงกูราน)
 หรือไอโซโปรโรโอเลน(ฟูจิ-วัน) หรือไตรเบซิคคอปเปอร์ซิลเฟต สำหรับใบชิตสีส้ม แนะนำใช้สารฆ่าแมลง
 เมื่อพบแมลงตัวอ่อน ใช้สารป้องกันและกำจัดแมลงพาหะที่เป็นตัวอ่อน เช่น - สารไดโนทีฟูเรน เป็นสารกำจัด
 แมลงชนิดดูดซึม สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เป็นต้น อัตราการใช้คือ ๕-๑๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร สารบูโพรเฟซิน
 เป็นสารยับยั้งการลอกคราบของแมลง ควบคุมการฟักไข่ ลดการวางไข่ จึงสามารถควบคุมแมลงได้นาน
 ป้องกันกำจัดเพลี้ย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น อัตราการใช้คือ ๒๐-๓๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
 อีโทเฟนพรอกซ์ เป็นสารกำจัดแมลงที่มีความเป็นพิษต่ำมากต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และยังไม่
 ตกค้างในสภาพแวดล้อมนาน เหมาะสมสำหรับ ข้าว ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ โดยอัตราการใช้กับแมลง
 จะแตกต่างกัน เพลี้ยในข้าว ใช้อัตรา ๔๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร (อัตราการใช้ น้ำ ๔๐ ลิตรต่อไร่) พ่นให้ทั่วเมื่อพบ
 เพลี้ยในนาข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ใช้อัตรา ๒๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร (อัตราการใช้ น้ำ ๔๐ ลิตรต่อไร่) พ่นให้
 ทั่วเมื่อพบการระบาดในข้าว ใช้สารสำหรับแมลงตัวเต็มวัย หากพบแมลงส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัย ให้ใช้สาร ดังนี้
 สารไทอะบีโทแซม (แอคทาร์ ๒๕% ดับบลิวพี) เป็นสารที่ออกฤทธิ์แบบดูดซึม คุมได้นาน เป็นผงใช้ง่าย ไม่ฟุ้ง
 กระจาย เป็นยาเย็น ใช้ป้องกันกำจัดแมลง อัตราการใช้ ๑-๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร สำหรับฉีดพ่นเพื่อป้องกัน
 เพลี้ยหรือแมลง และหากพบเพลี้ยแมลงระบาดควรใช้ในอัตรา ๕-๑๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรืออัตรา
 ๒ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร สารไดโนทีฟูเรน (สตาร์เกิล ๑๐% ดับบลิวพี) เป็นสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม
 สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น
 เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เป็นต้น อัตราการใช้คือ ๕-๑๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ซึ่งจากการให้คำแนะนำและ
 ตรวจสอบในพื้นที่คาดการณ์ว่าจากการใช้หลักวิธีการป้องกันแบบผสมผสาน จะสามารถควบคุมการแพร่
 ระบาดของโรคที่จะกระจายในวงกว้างได้ และทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายน้อยลง สิ่งสำคัญคือเกษตรกร
 ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการเข้าทำลายของโรคในพื้นที่แปลงนาข้าว เกษตรกรควรรีบ
 แจ้งข้อมูลกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้เคียง เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบและให้คำแนะนำวิธี
 ในการป้องกันกำจัดได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดผลกระทบที่อาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตและรายได้
 ของเกษตรกรในพื้นที่ได้