

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แนววิถีควบคุมแมลงหวี่ ขาวยาสูบ	๑. กรมส่งเสริมการเกษตร แนววิถีควบคุมแมลงหวี่ ขาวยาสูบ พาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง	Thailand Plus Online
แนววิถีควบคุมแมลงหวี่ ขาวยาสูบ	๒. กรมส่งเสริมการเกษตร แนววิถีควบคุมแมลงหวี่ ขาวยาสูบ พาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง	ไทยโพสต์ออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตร แนววิธีควบคุมแมลงหีวข้าวยาสูบ พาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง

๗ กันยายน 2022 Thailandplus เกษตร - สิ่งแวดล้อม



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังคือ แมลงหีวข้าว ยาสูบ ที่เป็นพาหะนำโรค ซึ่งนอกจากจะอาศัยอยู่กับต้นมันสำปะหลังแล้ว ยังสามารถแฝงตัวอยู่กับพืชชนิดอื่น หรือเรียกว่า “พืชอาศัย” ได้หลายชนิด ได้แก่ กะเพรา โหระพา มันฝรั่ง พืชตระกูลพริกและมะเขือ พืชตระกูล ถั่ว รวมถึงวัชพืชที่ติดมากับพืชอาศัย ดังนั้น เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัย เหล่านี้ในบริเวณเดียวกับพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง และควรหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกมันสำปะหลัง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มันเป็นแหล่งอาศัยของแมลงหีวข้าวยาสูบพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคำแนะนำในการป้องกันกำจัดแมลงหีวข้าวยาสูบ แนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงเพื่อกำจัดแมลงหีวข้าวยาสูบตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรบริเวณต้นมัน สำปะหลังในแปลงที่พบอาการใบด่างมันสำปะหลังและแปลงข้างเคียงด้วยสารเคมี ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ๗๐% WG อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน ๑๐% SL อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม ๒๕% WG อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไบเฟนทริน ๒.๕% EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไตรอะโซฟอส ๔๐% EC อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ทุก ๗ วัน กรณีจะทำการพ่นสารกำจัดแมลง ทางอากาศให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงด้วยอากาศยานไร้คนขับ ทั้งนี้ เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังสามารถขอคำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีควบคุม แมลงหวี่ขาวยาสูบ พาหะนำโรคใบด่างมัน สำปะหลัง

7 กันยายน 2565 เวลา 16:58 น.



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคใบด่าง มันสำปะหลังคือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ ที่เป็นพาหะนำโรค ซึ่งนอกจากจะอาศัยอยู่กับต้นมันสำปะหลังแล้ว ยังสามารถแฝงตัวอยู่กับพืชชนิดอื่นหรือเรียกว่า “พืชอาศัย” ได้หลายชนิด ได้แก่ กะเพรา โหระพา มันฝรั่ง พืชตระกูลพริกและมะเขือ พืชตระกูลถั่ว รวมถึงวัชพืชที่ติดมากับพืชอาศัย ดังนั้น เกษตรกรผู้ปลูก มันสำปะหลังควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยเหล่านี้ในบริเวณเดียวกับพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง และควรหมั่น กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้แหล่งอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะ นำโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคำแนะนำในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ แนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงเพื่อกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรบริเวณต้น มันสำปะหลังในแปลงที่พบอาการใบด่างมันสำปะหลังและแปลงข้างเคียงด้วยสารเคมี ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ๗๐% WG อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน ๑๐% SL อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม ๒๕% WG อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไบเฟนทริน ๒.๕% EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไตรอะโซฟอส ๔๐% EC อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ทุก ๗ วัน กรณี จะทำการพ่นสารกำจัดแมลงทางอากาศให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงด้วยอากาศยานไร้คนขับ ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังสามารถขอคำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน