



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2568

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ภัยพิบัติเกษตร	1	เกษตรฯ เตือนอุณหภูมิต่ำเสี่ยงกระทบนาข้าว แนะนำเกษตรกรจับตาใกล้ชิด	เว็บไซต์เดลินิวส์
	2	เกษตรฯ เตือนอุณหภูมิต่ำเสี่ยงกระทบนาข้าว แนะนำเกษตรกรจับตาใกล้ชิด	เว็บไซต์ spacebar
	3	เกษตรฯ เตือนอุณหภูมิต่ำเสี่ยงกระทบนาข้าว แนะนำเกษตรกรจับตาใกล้ชิด	เว็บไซต์ thailandplus
	4	เกษตรฯ เตือนอุณหภูมิต่ำเสี่ยงกระทบนาข้าว แนะนำเกษตรกรจับตาใกล้ชิด	เฟซบุ๊ก thailandplus
	5	แนวทางฟื้นฟู “มะพร้าว” หลังน้ำท่วม ใหญ่กลับมาสมบูรณ์แข็งแรง...	เว็บไซต์ข่าวสด
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
งานส่งเสริมการเกษตร	6	เกษตรบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ	เว็บไซต์ NBT Connex

เตือนชาวนาอากาศหนาว กระกบต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต

จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวปี 2568 อย่างเป็นทางการประกอบกับอุณหภูมิในช่วงนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์อากาศในเดือนธันวาคม 2568 ว่า ในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 16 -18 °C ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ที่ 17 -19 °C ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรประเมินสถานการณ์ว่าถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า 20 °C จะทำให้น้ำข้าวและผลผลิตได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว จึงขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์และสำรวจสังเกตในนาข้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแปลงปลูกข้าวของตน โดยพื้นที่เกษตรกรควรปฏิบัติ ดังนี้

ผลกระทบและความเสียหายต่อน้ำข้าว ระยะกล้า ต้นข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต แครกแกร็น ใบเหลือง และอาจทำให้หยุดการเจริญเติบโต ระยะแตกกอ ในช่วงนี้อาจเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล ระบาด ถ้าพบให้รีบจัดการ ระยะตั้งท้องถึงระยะออกดอก ในช่วงอุณหภูมิ 15 – 17 °C ทำให้เกสรตัวผู้เป็นหมัน การผสมเกสรจึงไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เมล็ดลีบ

แนวทางการป้องกันและดูแลรักษาข้าว หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน หรือวางแผนการปลูกข้าวไม่ให้กระทบอากาศหนาวเย็นช่วงข้าวตั้งท้องถึงออกรวง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต แนะนำให้กระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าว โดยพ่นฮอร์โมน NAA หรือไซโตไคนิน อัตรา 50 – 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นซ้ำทุก 7 วัน หรือใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น เช่น ชัยนาท 1 กข31 กข41 และ กข43 เป็นต้น สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

หากพบว่าใบข้าวแสดงอาการเหลือง ให้ชะลอการใส่ปุ๋ยทุกชนิด จนกว่าอุณหภูมิจะปรับตัวสูงตั้งแต่ 20 °C ขึ้นไป หากพบโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร หากอาการรุนแรง ใบข้าวเริ่มแห้งตายจากใบล่าง พ่นสารป้องกันกำจัดโรคอีดีเฟนฟอส เพื่อลดความรุนแรงของโรค อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลากและใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียม... สามารถติดตามต่อได้ที่ :

<https://www.dailynews.co.th/news/5385116/>

เกษตรกรเตือนอุณหภูมิต่ำเสี่ยงกระทบนาข้าว และเกษตรกรจับตาใกล้ขีด

9 ธ.ค. 2568 - 14:44

จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวปี 2568 อย่างเป็นทางการประกอบกับอุณหภูมิในช่วงนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์อากาศในเดือนธันวาคม 2568 ว่า ในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 16 -18 °C ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ที่ 17 -19 °C ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรประเมินสถานการณ์ว่าถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า 20 °C จะทำให้นาข้าวและผลผลิตได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว จึงขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์และสำรวจสังเกตในนาข้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแปลงปลูกข้าวของตน โดยพี่น้องเกษตรกรควรปฏิบัติ ดังนี้

ผลกระทบและความเสียหายต่อนาข้าว ระยะกล้า ต้นข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต แคร่แกร็น ใบเหลือง และอาจทำให้หยุดการเจริญเติบโต ระยะแตกกอ ในช่วงนี้อาจเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล ระบาด ถ้าพบให้บริหารจัดการระยะตั้งท้องถึงระยะออกดอก ในช่วงอุณหภูมิ 15 – 17 °C ทำให้เกษตรกรผู้เป็นหมัน การผสมเกสรจึงไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เมล็ดลีบ

แนวทางการป้องกันและดูแลรักษาข้าว หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน หรือวางแผนการปลูกข้าวไม่ให้กระทบอากาศหนาวเย็นช่วงข้าวตั้งท้องถึงออกรวง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต แนะนำให้กระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าว โดยพ่นฮอร์โมน NAA หรือไซโตไคนิน อัตรา 50 – 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นซ้ำทุก 7 วัน หรือใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น เช่น ชัยนาท 1 กข31 กข41 และ กข43 เป็นต้น สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

หากพบว่าใบข้าวแสดงอาการเหลือง ให้ชะลอการใส่ปุ๋ยทุกชนิด จนกว่าอุณหภูมิจะปรับตัวสูงตั้งแต่ 20 °C ขึ้นไป หากพบโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร หากอาการรุนแรง ใบข้าวเริ่มแห้งตายจากใบล่าง พ่นสารป้องกันกำจัดโรคอีดิเฟนฟอส เพื่อลดความรุนแรงของโรค อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลากและใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียม

หนาวแล้ว...ระวังข้าวกระกบหนาว

📅 9 ธันวาคม 2025 📍 Thailandplus 📺 ชีวิตกับการเกษตร, เกษตร - สิ่งแวดล้อม

จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวปี 2568 อย่างเป็นทางการประกอบกับอุณหภูมิในช่วงนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์อากาศในเดือนธันวาคม 2568 ว่า ในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 16 -18 °C ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ที่ 17 -19 °C ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรประเมินสถานการณ์ว่าถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า 20 °C จะทำให้น้ำข้าวและผลผลิตได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว จึงขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์และสำรวจสังเกตในนาข้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแปลงปลูกข้าวของตน โดยพี่น้องเกษตรกรควรปฏิบัติ ดังนี้

ผลกระทบและความเสียหายต่อน้ำข้าว ระยะกล้า ต้นข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต แคร่แกร็น ใบเหลือง และอาจทำให้หยุดการเจริญเติบโต ระยะแตกกอ ในช่วงนี้อาจเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล ระบาด ถ้าพบให้รีบจัดการ ระยะตั้งท้องถึงระยะออกดอก ในช่วงอุณหภูมิ 15 – 17 °C ทำให้เกสรตัวผู้เป็นหมัน การผสมเกสรจึงไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เมล็ดลีบ

แนวทางการป้องกันและดูแลรักษาข้าว หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน หรือวางแผนการปลูกข้าวไม่ให้กระทบอากาศหนาวเย็นช่วงข้าวตั้งท้องถึงออกรวง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต แนะนำให้กระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าว โดยพ่นฮอร์โมน NAA หรือไซโตไคนิน อัตรา 50 – 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นซ้ำทุก 7 วัน หรือใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น เช่น ชัยนาท 1 กข31 กข41 และ กข43 เป็นต้น สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

หากพบว่าใบข้าวแสดงอาการเหลือง ให้ชะลอการใส่ปุ๋ยทุกชนิด จนกว่าอุณหภูมิจะปรับตัวสูงตั้งแต่ 20 °C ขึ้นไป หากพบโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร หากอาการรุนแรง ใบข้าวเริ่มแห้งตายจากใบล่าง พ่นสารป้องกันกำจัดโรคอีดิเฟนฟอส เพื่อลดความรุนแรงของโรค อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลากและใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียม

<https://www.facebook.com/Thailandplus.Online/posts/pfbid02AqkmazgtdKjTr58bVgVkgHnsBiUrVD6xrGHy5MzNoDeqXy9t4ZN9oLe6BEw4xol?rclid=JPNiRjKcQ6gtVo1w#>

โพสต์ของ Thailandplus.TV
✕


Thailandplus.TV
 9 ธันวาคม เวลา 17:44 น. - 

หนาวแล้ว...ระวังข้าวกระเทยหนาว <https://www.thailandplus.tv/archives/980416>



หนาวแล้ว...ข้าวกระเทย

ข้าวกระเทยหนาว



ประเทศไทย ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป



ผลกระทบต่อน้ำในระยะเวลาต่าง ๆ

- 
ระยะกล้า : ต้นข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต แคร่แกร็น ใบเหลือง และอาจทำให้หยุดการเจริญเติบโต
- 
ระยะแตกกอ : อาจเกิด "โรคใบจุดสีน้ำตาล" ระบาด
- 
ระยะตั้งท้อง ถึง ระยะออกรวง : ในช่วงอุณหภูมิ 15 - 17 °C ทำให้เกสรตัวผู้เป็นหมัน การผสมเกสรจึงไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เมล็ดลีบ

ลักษณะอาการข้าวกระเทยหนาว



โรคใบจุดสีน้ำตาล



ข้าวออกรวงลีบ

แนวทางการป้องกันและดูแลรักษาข้าว

- 
หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน หรือวางแผนการปลูกข้าวไม่ให้กระทบอากาศหนาวเย็นช่วงข้าวตั้งท้องถึงออกรวง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต
- 
แนะนำให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยของข้าว โดยพันธุ์ข้าวใน NAA หรือไฮโดรเจน อัตรา 50 - 100 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นซ้ำทุก 7 วัน
- 
ใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น เช่น ชัยนาท1 กข31 กข41 และ กข43 เป็นต้น
- 
สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าใบข้าวแสดงอาการเหลือง ให้ชะลอการใส่ปุ๋ยทุกชนิด จนกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 20 °C ขึ้นไป
- 
หากพบโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร หากอาการรุนแรง ใบข้าวเริ่มแห้งตายจากใบล่าง พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชดีเฟนดอส เพื่อลดความรุนแรงของโรค อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลากและใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียม

แหล่งข้อมูล : กรมการข้าว
 ภาพ : กรมการข้าว
 เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย
 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร



แนวทางฟื้นฟู “มะพร้าว” หลังน้ำท่วม ให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรง

09 ธันวาคม 2568 สุรเดช สดคมขำ

f

เมื่อสวนมะพร้าวประสบภาวะน้ำท่วม การฟื้นฟูอย่างเป็นระบบถือเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้ต้นกลับมาให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ได้ตามเดิม กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุม 5 ด้าน ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้เพื่อฟื้นฟูสวนได้ทันที

MOST POPULAR

Featured

แนวทางการฟื้นฟูดินมะพร้าวมีหลายวิธี เช่น การปรับสภาพแวดล้อมหลังน้ำท่วม การใส่ปุ๋ยบำรุง การใช้อินทรีย์และสารปรับปรุงดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการดูแลให้น้ำอย่างเหมาะสม

1 การจัดการพื้นที่

- ระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด และปล่อยให้ดินแห้งอย่างน้อย 2 วัน
- กำจัดโคลนที่ก้นกอ
- ตัดแต่งกิ่งที่เสียหาย ปลิดผลหรือดอกที่ไม่สมบูรณ์
- พรวนดินมะพร้าวเพื่อป้องกันการล้ม

2 การปรับปรุงและบำรุงดิน

- ปรับสภาพดินให้เป็นด่างด้วยการใส่ปูนขาวหรือโดโลไมต์ 0.5 - 1 กก./ต้น
- ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในหลุมหรือรางที่ขุดรอบโคนต้น เพื่อเพิ่มสารอาหารและช่วยให้ดินร่วนซุย
- คลุมดินรอบโคนต้นด้วยฟางหรือใบไม้เพื่อรักษาความชื้นและลดวัชพืช
- ปรับโครงสร้างดินด้วยการผสมแกลบดำหรือแกลบหมักลงในดินเพื่อช่วยให้ดินร่วนซุย
- ทำน้ำหมักจากมะพร้าวเพื่อใช้รดต้นไม้ ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์และสารอาหารให้ดิน
- ควรตรวจวิเคราะห์ pH ดินและน้ำ สารพิษ และสารโลหะหนักที่อาจตกค้าง

3 การบำรุงดินและการให้ปุ๋ย

- ให้ปุ๋ยทางใบเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ต้น
- ปุ๋ยสูตรต่าง ๆ
 - ปุ๋ยบำรุงต้น ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 หรือ 15 - 14 - 16 ปริมาณ 1.5 - 3 กก./ต้น/ปี แบ่งใส่ 3 - 4 ครั้ง
 - ปุ๋ยบำรุงผลผลิต ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 5 - 20 หรือ 15 - 3 - 21 หรือ 15 - 5 - 25 หรือ 12 - 6 - 24 ปริมาณ 1.5 - 3 กก./ต้น/ปี แบ่งใส่ 3 - 4 ครั้ง
 - ปุ๋ยสำหรับต้นใหม่ ใส่ปุ๋ยสูตร 25 - 7 - 7 ประมาณ 100 กรัม/ต้น/เดือน เพื่อบำรุงต้นในระยะแรก
 - ปุ๋ยน้ำ 12 - 12 - 12 หรือ ปุ๋ยเกล็ด 20 - 20 - 20 / 21 - 21 - 21
 - น้ำตาลเค็ชโรรส 600 กรัม
 - ฮิวมิคแอซิด 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
 - สารจับใบ + สารป้องกันและกำจัดโรค/แมลง ฉีดพ่นทุก 3 วัน จนกระทั่งแตกใบอ่อนและเพลสลาด
 - ใส่โดโรโคเดอนา ราด/ขยายปุ๋ย หมัก 3 - 5 กก./ต้น
 - ปุ๋ยหมักขยายเชื้อ พุด.3 จำนวน 3.5 กก./ต้น

4 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

- ใช้สารชีวภาพ โดยการใช้น้ำหมักสมุนไพร เช่น ข่า สะเดา พริก หรือใบมะกรูดเพื่อไล่แมลงศัตรูพืช
- ควบคุมโรค ป้องกันโรคจากความชื้นโดยหลีกเลี่ยงการให้น้ำขังบริเวณราก
- กรณีรากเน่าโคนเน่า เชื้อราฟักเทียม โฟสปอรัส ใช้หีดหรือแสง สิริรักษ์บี/เบนดาซอล /ฟอสเฟกัลลูนิบ 100 กรัม/น้ำ 1 ลิตร
- กรณีโรคเน่าโคนเน่า เชื้อราฟูซารีอัม /ไรซอกโทเนีย/สโครโรเทียม ราดสารเคมีฟิธเอนบีหรือเทอร์ราคลอร์ 50 - 60 มิลลิลิตร/น้ำ 1 ลิตร
- หากพบปัญหาศัตรูพืชหรือโรคพืช ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

5 การให้น้ำ

- ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ โดยเฉพาะใบปีแรกอาจให้น้ำสัปดาห์ละครั้ง และเมื่อต้นโตขึ้นอาจให้น้ำทุก 2 สัปดาห์
- ควบคุมปริมาณน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำไม่ถึงโคนต้นเพื่อป้องกันโรค

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน