



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แมลงบัว	1	อากาศเย็นลง หมอกหนา เตือนชาวนาระวัง “แมลงบัว” ศัตรูร้าย ทำลายข้าว	เว็บไซต์ ok-esan
			เว็บไซต์ newswit
			เว็บไซต์ thaipbs
			เว็บไซต์ Agrinewsthai
โรคลำต้นเน่าในต้นปาล์ม	2	ภัยเงียบ ที่ชาวสวนปาล์มต้องระวัง !! หลังชาวสวนปาล์มกระบี่ พบโรคลำต้นเน่าในต้นปาล์ม พบเชื้อราในดิน เกษตรกระบี่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทำลายเห็ด และแนะนำวิธีป้องกันและรักษา	เว็บไซต์ talknewsonline
			เว็บไซต์ talknewsonline
Field Day	3	จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม Field Day “ทุ่งกุลาม่วนชื่น : โลกเปลี่ยน คนปรับ ความท้าทายข้าวทางเลือกเพื่อความยั่งยืน”	เว็บไซต์ surin.prd



กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เฝ้าระวังแมลงบั่วศัตรูข้าว เนื่องจากพยากรณ์อากาศในระยะนี้รายงานว่าภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยแมลงบั่วจะระบาดมากในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมั่นสำรวจแปลงนา เมื่อพบแมลงบั่ว ศัตรูข้าวดังกล่าวในแปลงนาเพาะปลูกของตน ควรรีบป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรง ซึ่งล่าสุดได้รับรายงานว่ามีแมลงบั่วเข้าทำลายนาข้าวแล้วในพื้นที่จังหวัดนครพนม นครราชสีมา อุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก รวมจำนวนพื้นที่ 85 ไร่

ลักษณะการทำลายของแมลงบั่ว หนอนแมลงบั่วจะเข้าทำลายส่วนเจริญของตาดอกรข้าว สามารถสังเกตเห็นอาการเป็นหลอดคล้ายหลอดหอม เรียกว่า หลอดบั่ว ซึ่งเมื่อถูกทำลาย ต้นข้าวจะแคระแกรน ลำต้นกลมเตี้ย มีสีเขียวเข้ม และยอดที่ถูกทำลายจะไม่ออกรวง ทำให้ไม่ได้รับผลผลิตข้าวตามที่ต้องการโดยหนอนแมลงบั่ว

มีลักษณะคล้ายหนอนแมลงวันลักษณะหัวท้ายเรียว ในส่วนของตัวเต็มวัยนั้น จะมีลักษณะคล้ายยุง ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเหลือง ลำตัวยาว 3-4 มิลลิเมตร หนวดมีสีดำ โดยแมลงบั่วเพศเมียจะวางไข่ใต้ใบข้าวในเวลากลางคืน

การป้องกันกำจัดแมลงบั่ว ควรกำจัดวัชพืชรอบแปลงนา เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนอาศัยของศัตรูพืช รวมทั้งควรอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวดิน แมงมุม แตนเบียนของแมลงบั่ว เป็นต้น และสำหรับตัวเต็มวัยของแมลงบั่วให้ใช้กับดักแสงไฟล่อมาทำลาย หากมีการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำได้แก่ สารกลุ่ม 2B ได้แก่ อิติพรีล และสารกลุ่ม 4A ได้แก่ อิมิดาโคลพรีด หรือไทอะมีไทแรม หรือไทอะโคลพรีด หรือโคลไทอะนินดิน มาพ่นในแปลงดังกล่าว โดยแนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ห่างกันทุก 7 วันไม่เกิน 3 ครั้ง และหมั่นเฝ้าระวังการออกฤทธิ์ ไม่พ่นซ้ำสารในกลุ่มเดิมในรอบวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช เพื่อชะลอความต้านทานต่อสารกำจัดแมลง อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวก่อนปลูกข้าวเพื่อป้องกันแมลงบั่วเข้าทำลายนั้น เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวในช่วงที่แมลงบั่วมาเล่นแสงไฟจำนวนมาก และไม่ควรหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณมากหรือปักดำถี่จนเกินไป ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน



กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฝ้าระวังแมลงบั่วศัตรูข้าว เนื่องจากพยากรณ์อากาศในระยะนี้รายงานว่าภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยแมลงบั่วจะระบาดมากในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมั่นสำรวจแปลงนา เมื่อพบแมลงบั่ว ศัตรูข้าวดังกล่าวในแปลงนาเพาะปลูกของตน ควรรีบป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรง ซึ่งล่าสุดได้รับรายงานว่าเริ่มพบแมลงบั่วเข้าทำลายนาข้าวแล้วในพื้นที่จังหวัดนครพนม นครราชสีมา อุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก รวมจำนวนพื้นที่ 85 ไร่

อากาศเย็นลง หมอกหนา เดือนชาวนาระวัง "แมลงบั่ว" ศัตรูร้ายทำลายข้าว

ลักษณะการทำลายของแมลงบั่ว หนอนแมลงบั่วจะเข้าทำลายส่วนเจริญของตาดอข้าว สามารถสังเกตเห็นอาการเป็นหลอดคล้ายหลอดหอม เรียกว่า หลอดบั่ว ซึ่งเมื่อถูกทำลาย ต้นข้าวจะแคระแกรน ลำต้นกลมเตี้ย มีสีเขียวเข้ม และยอดที่ถูกทำลายจะไม่ออกรวง ทำให้ไม่ได้ผลผลิตข้าวตามที่ต้องการโดยหนอนแมลงบั่วมีลักษณะคล้ายหนอนแมลงวันลักษณะหัวท้ายเรียว ในส่วนของตัวเต็มวัยนั้น จะมีลักษณะคล้ายยุง ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเหลือง ลำตัวยาว 3-4 มิลลิเมตร หนวดมีสีดำ โดยแมลงบั่วเพศเมียจะวางไข่ใต้ใบข้าวในเวลากลางคืน อากาศเย็นลง หมอกหนา เดือนชาวนาระวัง "แมลงบั่ว" ศัตรูร้ายทำลายข้าว

การป้องกันกำจัดแมลงบั่ว ควรกำจัดวัชพืชรอบแปลงนา เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนอาศัยของศัตรูพืช รวมทั้งควรอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวดิน แมงมุม แตนเบียนของแมลงบั่ว เป็นต้น และสำหรับ

ตัวเต็มวัยของแมลงบั่วให้ใช้กับดักแสงไฟล่อมาทำลาย หากมีการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำ ได้แก่ สารกลุ่ม 2B ได้แก่ อิติโพรล และสารกลุ่ม 4A ได้แก่ อิมิดาโคลพริด หรือไทอะมีโทแซม หรือไทอะโคลพริด หรือโคลไทอะนินดิน มาพ่นในแปลงดังกล่าว โดยแนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ห่างกันทุก 7 วันไม่เกิน 3 ครั้ง และหมุนเวียนสารตามกลไกการออกฤทธิ์ ไม่พ่นซ้ำสารในกลุ่มเดิมในรอบวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช เพื่อชะลอความต้านทานต่อสารกำจัดแมลง อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวก่อนปลูกข้าวเพื่อป้องกันแมลงบั่วเข้าทำลายนั้น เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวในช่วงที่แมลงบั่วมาเล่นแสงไฟจำนวนมาก และไม่ควรหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณมากหรือปักดำถี่จนเกินไป ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน



กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวนา ฝ้าระวังแมลงบั่วศัตรูข้าวมาพร้อมกับสภาพอากาศหนาว-หมอกหนา หลังพบภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีแมลงบั่วที่มากพร้อมกับความชื้น และเร่งป้องกัน ล่าสุดแมลงบั่ว บุกนาข้าวแล้ว 85 ไร่

วันนี้ (11 พ.ย.2568) กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฝ้าระวังแมลงบั่วศัตรูข้าว เนื่องจากพยากรณ์อากาศในระยะนี้รายงานว่าภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยแมลงบั่วจะระบาดมากในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหมั่นสำรวจแปลงนา เมื่อพบแมลงบั่ว ศัตรูข้าวดังกล่าวในแปลงนาเพาะปลูกของตน ควรรีบป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรง ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีแมลงบั่วเข้าทำลายนาข้าวแล้วในพื้นที่จ.นครพนม นครราชสีมา อุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก รวมจำนวนพื้นที่ 85 ไร่

ลักษณะการทำลายของแมลงบั่ว หนอนแมลงบั่วจะเข้าทำลายส่วนเจริญของตาดอข้าว สามารถสังเกตเห็นอาการเป็นหลอดคล้ายหลอดหอม เรียกว่า หลอดบั่ว ซึ่งเมื่อถูกทำลาย ต้นข้าวจะแคระแกรน ลำต้นกลมเตี้ย มีสีเขียวเข้ม และยอดที่ถูกทำลายจะไม่ออกรวง ทำให้ไม่ได้ผลผลิตข้าวตามที่ต้องการโดยหนอนแมลงบั่ว

สำหรับแมลงบั่ว มีลักษณะคล้ายหนอนแมลงวันลักษณะหัวท้ายเรียว ในส่วนของตัวเต็มวัยนั้น จะมีลักษณะคล้ายยุง ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเหลือง ลำตัวยาว 3-4 มิลลิเมตร หนวดมีสีดำ โดยแมลงบั่วเพศเมียจะวางไข่ใต้ใบข้าวในเวลากลางคืน

ส่วนการป้องกันกำจัดแมลงบัว ควรกำจัดวัชพืชรอบแปลงนา เพื่อไม่ให้แหล่งหลบซ่อนอาศัยของ ศัตรูพืช รวมทั้งควรอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวงดิน แมงมุม แตนเบียนของแมลงบัว เป็นต้น

ส่วนตัวเต็มวัยของแมลงบัวให้ใช้กับดักแสงไฟล่อมาทำลาย หากมีการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีตาม คำแนะนำ ได้แก่ สารกลุ่ม 2B ได้แก่ อิทธิพรอล และสารกลุ่ม 4A ได้แก่ อิมิดาโคลพริด หรือไทอะมีไทแธม หรือไทอะโคลพริด หรือโคลไทอะนินดิน มาพ่นในแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้กรมฯแนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ห่างกันทุก 7 วันไม่เกิน 3 ครั้ง และหมุนเวียน สารตามกลไกการออกฤทธิ์ ไม่พ่นซ้ำสารในกลุ่มเดิมในรอบวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช เพื่อชะลอความ ต้านทานต่อสารกำจัดแมลง อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวก่อนปลูกข้าวเพื่อป้องกันแมลงบัวเข้าทำลายนั้น เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวในช่วงที่แมลงบัวมาเล่นแสงไฟจำนวนมาก และไม่ควรหว่านเมล็ด พันธุ์ข้าวในปริมาณมากหรือปักดำถี่จนเกินไป ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน



อากาศเย็นลง หมอกหนา เตือนชาวนาระวัง “แมลงบั่ว” ศัตรูร้ายทำลายข้าว

🕒 11 พ.ย. 2025 📁 ข่าวเกษตร, สไลด์

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เฝ้าระวังแมลงบั่วศัตรูข้าว เนื่องจากพยากรณ์อากาศในระยะนี้รายงานว่าภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยแมลงบั่วจะระบาดมากในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมั่นสำรวจแปลงนา เมื่อพบแมลงบั่ว ศัตรูข้าวดังกล่าวในแปลงนาเพาะปลูกของตน ควรรีบป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรง ซึ่งล่าสุดได้รับรายงานว่ามีแมลงบั่วเข้าทำลายนาข้าวแล้วในพื้นที่จังหวัดนครพนม นครราชสีมา อุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก รวมจำนวนพื้นที่ 85 ไร่

ลักษณะการทำลายของแมลงบั่ว หนอนแมลงบั่วจะเข้าทำลายส่วนเจริญของตาดอข้าว สามารถสังเกตเห็นอาการเป็นหลอดคล้ายหลอดหอม เรียกว่า หลอดบั่ว ซึ่งเมื่อถูกทำลาย ต้นข้าวจะแคระแกรน ลำต้นกลมเตี้ย มีสีเขียวเข้ม และยอดที่ถูกทำลายจะไม่ออกรวง ทำให้ไม่ได้ผลผลิตข้าวตามที่ต้องการโดย หนอนแมลงบั่วมีลักษณะคล้ายหนอนแมลงวันลักษณะหัวท้ายเรียว ในส่วนของตัวเต็มวัยนั้น จะมีลักษณะคล้ายยุง ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเหลือง ลำตัวยาว 3-4 มิลลิเมตร หนวดมีสีดำ โดยแมลงบั่วเพศเมียจะวางไข่ใต้ใบข้าวในเวลากลางคืน

การป้องกันกำจัดแมลงบั่ว ควรกำจัดวัชพืชรอบแปลงนา เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนอาศัยของศัตรูพืช รวมทั้งควรอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวดิน แมงมุม แตนเบียนของแมลงบั่ว เป็นต้น และสำหรับตัวเต็มวัยของแมลงบั่วให้ใช้กับดักแสงไฟล่อมาทำลาย หากมีการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีตาม

คำแนะนำ ได้แก่ สารกลุ่ม 2B ได้แก่ อิทธิพล และสารกลุ่ม 4A ได้แก่ อิมิดาโคลพริด หรือไทอะมีไทแธม หรือไทอะโคลพริด หรือโคลไทอะนิน มาพ่นในแปลงดังกล่าว โดยแนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ห่างกันทุก 7 วันไม่เกิน 3 ครั้ง และหมุนเวียนสารตามกลไกการออกฤทธิ์ ไม่พ่นซ้ำสารในกลุ่มเดิมในรอบวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช เพื่อชะลอความต้านทานต่อสารกำจัดแมลง อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวก่อนปลูกข้าวเพื่อป้องกันแมลงบั่วเข้าทำลายนั้น เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวในช่วงที่แมลงบั่วมาเล่นแสงไฟจำนวนมาก และไม่ควรหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณมากหรือปักดำถี่เกินไป ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน



อากาศเย็นลง หมอกหนา เตือนชาวนาระวัง “แมลงบั่ว” ศัตรูร้ายทำลายข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เฝ้าระวังแมลงบั่วศัตรูข้าว เนื่องจากพยากรณ์อากาศในระยะนี้รายงานว่ามีโอกาสที่ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยแมลงบั่วจะระบาดมากในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมั่นสำรวจแปลงนา เมื่อพบแมลงบั่ว ศัตรูข้าวดังกล่าวในแปลงนาเพาะปลูกของตน ควรรีบป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรง ซึ่งล่าสุดได้รับรายงานว่ามีแมลงบั่วเข้าทำลายนาข้าวแล้วในพื้นที่จังหวัดนครพนม นครราชสีมา อุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก รวมจำนวนพื้นที่ 85 ไร่

ลักษณะการทำลายของแมลงบั่ว หนอนแมลงบั่วจะเข้าทำลายส่วนเจริญของตาดอข้าว สามารถสังเกตเห็นอาการเป็นหลอดคล้ายหลอดหอม เรียกว่า หลอดบั่ว ซึ่งเมื่อถูกทำลาย ต้นข้าวจะแคระแกรน ลำต้นกลมเตี้ย มีสีเขียวเข้ม และยอดที่ถูกทำลายจะไม่ออกรวง ทำให้ไม่ได้ผลผลิตข้าวตามที่ต้องการโดยหนอนแมลงบั่ว มีลักษณะคล้ายหนอนแมลงวันลักษณะหัวท้ายเรียว ในส่วนของตัวเต็มวัยนั้น จะมีลักษณะคล้ายยุง ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเหลือง ลำตัวยาว 3-4 มิลลิเมตร หนวดมีสีดำ โดยแมลงบั่วเพศเมียจะวางไข่ใต้ใบข้าวในเวลากลางคืน

การป้องกันกำจัดแมลงบั่ว ควรกำจัดวัชพืชรอบแปลงนา เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนอาศัยของศัตรูพืช รวมทั้งควรอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวดิน แมงมุม แตนเบียนของแมลงบั่ว เป็นต้น และสำหรับตัวเต็มวัยของแมลงบั่วให้ใช้กับดักแสงไฟล่อมาทำลาย หากมีการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีตาม

คำแนะนำ ได้แก่ สารกลุ่ม 2B ได้แก่ อิทธิพล และสารกลุ่ม 4A ได้แก่ อิมิดาโคลพริด หรือไทอะมีไทแธม หรือไทอะโคลพริด หรือโคลไทอะนินดิน มาพ่นในแปลงดังกล่าว

โดยแนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ห่างกันทุก 7 วันไม่เกิน 3 ครั้ง และหมุนเวียนสารตามกลไกการออกฤทธิ์ ไม่พ่นซ้ำสารในกลุ่มเดิมในรอบวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช เพื่อชะลอความต้านทานต่อสารกำจัดแมลง อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวก่อนปลูกข้าวเพื่อป้องกันแมลงบั่วเข้าทำลายนั้น เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวในช่วงที่แมลงบั่วมาเล่นแสงไฟจำนวนมาก และไม่ควรหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณมากหรือปักดำถี่จนเกินไป ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอไกล่บ้านท่าน

ที่มา : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร



<https://www.talknewsonline.com/?p=12534>

11 พฤศจิกายน 2568

ภัยเงียบ ที่ชาวสวนปาล์มต้องระวัง !! หลังชาวสวนปาล์มกระบี่ พบโรคลำต้นเน่าในต้นปาล์ม พบเชื้อราในดิน เกษตรกระบี่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทำลายเห็ด และแนะนำวิธีป้องกันและรักษา

by namchan — 11 พฤศจิกายน 2025 in ประชาสัมพันธ์, เกษตรกร Reading Time: 1 min read



11 พย 68 เกษตรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ พื้นที่แปลงสวนปาล์มน้ำมันแห่งหนึ่งใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ พบโรคลำต้นเน่าในปาล์ม ในพื้นที่แปลงปลูกปาล์มของนายมนโนธรรม ใจหาญ เป็นเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งได้ไปแจ้ง นส.ชวนคนึง วัชรวิญกุล เกษตรอำเภอกลองท่อม ได้ประสานงานไปยัง

สนง.เกษตรจังหวัดกระบี่ โดยมี นายวงศกร เอียดเอื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช ได้เดินทางพร้อม จนท มาตรวจสอบในพื้นที่ ม.9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ได้พบเชื้อรา โรคลำต้นเน่าในปาล์ม ซึ่งมีสภาพลำต้นโคนหักโคนลงมา เป็นจำนวน 2 ต้น และ 1 ต้นพบดอกเห็ดมีสภาพลำต้นมีดอกเห็ดแล้ว ซึ่งเป็นเชื้อ Ganoderma sp. พร้อมได้แนะนำทำลายเห็ด โดยวิธีการเผา และแนะนำวิธีป้องกันและรักษา

โรคดังกล่าว มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหาศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคลำต้นเน่าสาเหตุจากเชื้อ Ganoderma sp. พบแพร่กระจายในสวนเป็นบางจุด ปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะในทางภาคใต้ โดยเชื้อราจะเข้าทำลายจากรากสู่ลำต้นผ่านทางท่อลำเลียงอาหารและน้ำ ทำให้เนื้อเยื่อภายในลำต้นเกิดแผลเน่าสีน้ำตาล อาการผิดปกติภายนอกที่พบคือ ใบมีสีซีดจางกว่าปกติ ทางใบแก่กลางจะหักพับทั้งตัวห้อยลงรอบๆ ลำต้น ยอดที่ยังไม่คลี่มีสีเหลือง หรือมีจำนวนมากกว่าปกติ ในระยะรุนแรงเชื้อราจะพัฒนาและเจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดบริเวณโคนต้น รากและเนื้อเยื่อภายในลำต้นจะเปื่อยแห้งเป็นผง จนเกิดเป็นโพรงในที่สุด ทำให้ต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นตายหรือหักล้มลง การระบาดเกิดจากการแพร่กระจายทางลมของสปอร์ดอกเห็ดที่เกิดบริเวณโคนต้น ดอกหรือซากปาล์มเก่า หรือจากการสัมผัสกันของรากต้นที่เป็นโรค และรากของต้นปกติในดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันจึงทำให้การควบคุมโรคยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร

นายวงศกร เอียดเอื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช เกษตรจ.กระบี่ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาจัดการโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน และให้คำแนะนำโดยเปรียบเทียบการควบคุมด้วยสารเคมี การควบคุมด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา 2 สายพันธุ์ จากหน่วยงานรัฐ และเอกชน ว่าหากพบดอกเห็ดบนต้นปาล์ม ให้ถากเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นโรคออกเพราะเชื้อราก็จะอยู่ที่บริเวณเนื้อตายและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการจัดการเชื้อก่อโรค จะให้ผลดีที่สุด แต่เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถทำลายได้เฉพาะส่วนที่สัมผัส ถ้าไม่ถากเนื้อเยื่อที่เป็นโรคออกก็จะทำให้การทำลายเชื้อก่อโรคไม่ได้ผล

นอกจากนี้ กล่าวว่า เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่จะเกิดขึ้น จึงขอแนะนำดังนี้ ในการเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ ให้กำจัดซากต้นปาล์มเก่า และทำความสะอาดเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อเห็ดที่ติดอยู่กับซากพืช และพื้นที่ควรจัดการให้มีการระบายน้ำให้ดี ซึ่งวิธีการป้องกันกำจัด คืออย่าเคลื่อนย้ายต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคผ่านไปแปลงปาล์มน้ำมัน ชูตรง หรือครอบบริเวณต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคเพื่อป้องกันการสัมผัสของราก

“นอกจากนี้ ยังแนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช โดย 1. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมกับรำละเอียด 4 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม หว่านรอบทรงพุ่มในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 20-100 ลิตร กรองเอาเฉพาะน้ำนำไปฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันโรคในส่วนบนของต้นปาล์มน้ำมัน”

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ข้อมูลข่าว / ภาพ

จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม Field Day “ทุ่งกุลาม่วนชื่น : โลกเปลี่ยน คนปรับ ความท้าทายข้าวทางเลือกเพื่อความยั่งยืน”

 11/11/2568 |  87 | 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.30 น.

ณ แปลงข้าวชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านพรมเทพ ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Field Day ทุ่งกุลาม่วนชื่น : โลกเปลี่ยน คนปรับ ความท้าทายข้าวทางเลือกเพื่อความยั่งยืน”

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตข้าว พร้อมสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายในงานมี เกษตรจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอท่าตูม นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง บรรยายภาคเติมไปด้วยความร่วมมือและความมุ่งมั่นในการพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดสุรินทร์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก