



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2568

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ข้าว	1	อากาศหนาวกระทบนาข้าว! แนววิธีรับมือป้องกันข้าวแคะแกร็น-เม็ล็ดลีบ	เว็บไซต์
			technologychaoban
ส้ม	2	เกษตรกรจังหวัดแพร่ เตือนเกษตรกรระวัง เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ในพืชตระกูลส้ม	เว็บไซต์ thaitabloid
			เว็บไซต์ radiophrae



Featured News

อากาศหนาวกระทบนาข้าว! แนววิธีรับมือป้องกันข้าวแคะแกร็น-เมล็ดลีบ

11 ธันวาคม 2568 สุรเดช สดคมมา



จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวปี 2568 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 กอปรกับอุณหภูมิในช่วงนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์อากาศในเดือนธันวาคม 2568

ในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 16 -18 °C ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ที่ 17 -19 °C ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรประเมินสถานการณ์ว่าถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า 20 °C จะทำให้นาข้าวและผลผลิตได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว จึงขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์และสำรวจสังเกตในนาข้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแปลงปลูกข้าวของตน โดยพี่น้องเกษตรกรควรปฏิบัติ ดังนี้ ผลกระทบและความเสียหายต่อนาข้าว ระยะกล้า ต้นข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต แคะแกร็น ใบเหลือง และอาจทำให้หยุดการเจริญเติบโต ระยะแตกกอ ในช่วงนี้อาจเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล ระบาด ถ้าพบให้รีบจัดการ ระยะตั้งท้องถึงระยะออกดอก ในช่วงอุณหภูมิ 15 – 17 °C ทำให้เกสรตัวผู้เป็นหมัน การผสมเกสร จึงไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เมล็ดลีบ

แนวทางการป้องกันและดูแลรักษาข้าว หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน หรือวางแผนการปลูกข้าวไม่ให้กระทบอากาศหนาวเย็นช่วงข้าวตั้งท้องถึงออกรวง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต แนะนำให้กระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าว โดยพ่นฮอร์โมน NAA หรือไซโตไคนิน อัตรา 50 – 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นซ้ำทุก 7 วัน

หรือใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น เช่น ชัยนาท1 กข31 กข41 และ กข43 เป็นต้น สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าใบข้าวแสดงอาการเหลือง ให้ชะลอการใส่ปุ๋ยทุกชนิด จนกว่าอุณหภูมิจะปรับตัวสูงตั้งแต่ 20 °C ขึ้นไป หากพบโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร หากอาการรุนแรง ใบข้าวเริ่มแห้งตายจากใบล่าง พ่นสารป้องกันกำจัดโรคอีดิเฟนฟอส เพื่อลดความรุนแรงของโรค อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลากและใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียม

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวนา หนาวแล้ว... ระวังข้าวกระเทยหนาว เตรียมแนวทางการ ป้องกันและดูแลรักษาข้าว

By Thaitabloid3 10 ส.ค. 2025

200




จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวปี 2568 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 กอปรกับอุณหภูมิในช่วงนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์อากาศในเดือนธันวาคม 2568 ว่า ในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 16-18 °C ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ที่ 17-19 °C

กรมส่งเสริมการเกษตร ประเมินสถานการณ์ว่าถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า 20 °C จะทำให้น้ำข้าวและผลผลิตได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว จึงขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ และสำรวจสังเกตในนาข้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแปลงปลูกข้าวของตน

โดยพี่น้องเกษตรกรควรปฏิบัติ ดังนี้ ผลกระทบและความเสียหายต่อน้ำข้าว ระยะกล้า ต้นข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต แคร่แกร็น ใบเหลือง และอาจทำให้หยุดการเจริญเติบโต ระยะแตกกอ ในช่วงนี้อาจเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล ระบาด ถ้าพบให้รีบจัดการ ระยะตั้งท้องถึงระยะออกดอก ในช่วงอุณหภูมิ 15 – 17 °C ทำให้เกสรตัวผู้เป็นหมัน การผสมเกสรจึงไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เมล็ดลีบ

แนวทางการป้องกันและดูแลรักษาข้าว หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน หรือวางแผนการปลูกข้าวไม่ให้กระทบอากาศหนาวเย็นช่วงข้าวตั้งท้องถึงออกรวง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต แนะนำให้กระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าว โดยพ่นฮอร์โมน NAA หรือไซโตไคนิน อัตรา 50-100 มม. ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นซ้ำทุก 7 วัน หรือใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น เช่น ชัยนาท1 กข31 กข41 และ กข43 เป็นต้น

นอกจากนี้ ต้องสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าใบข้าวแสดงอาการเหลือง ให้ชะลอการใส่ปุ๋ยทุกชนิด จนกว่าอุณหภูมิจะปรับตัวสูงตั้งแต่ 20 °C ขึ้นไป หากพบโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กก.ต่อน้ำ 100 ลิตร หากอาการรุนแรง ใบข้าวเริ่มแห้งตายจากใบล่าง พ่นสารป้องกันกำจัดโรคอีดีเฟนฟอส เพื่อลดความรุนแรงของโรค อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลากและใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียม



เกษตรจังหวัดแพร่ เตือนเกษตรกรระวัง เพลี้ยไก่อ้แจ้ส้ม ในพืชตระกูลส้ม

9/12/2568 | 174 |

นางสาวอัญชลี ปัญญาควรว เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็นมีหมอกกลงในตอนเช้า กลางวันร้อน และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ เกษตรจังหวัดแพร่จึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลส้ม เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน ในระยะต้นแตกยอดอ่อน ติดผลอ่อน จนถึงส้มได้ขนาดเบอร์ 4 ควรเตรียมรับมือกับเพลี้ยไก่อ้แจ้ส้ม

เพลี้ยไก่อ้แจ้ส้ม ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากตาและยอดอ่อนต้นพืช สำหรับตัวอ่อนขณะดูดกินจะกลั่นสารสีขาวมีลักษณะเป็นเส้นด้าย และชักนำให้เกิดราดำ ยอดที่ถูกทำลายจะหงิกงอ และแห้งเหี่ยว ถ้าการทำลายถึงขั้นรุนแรงทำให้ใบร่วงติดผลน้อยหรือไม่ติดผลเลย นอกจากทำลายยอดอ่อนโดยตรงแล้ว เพลี้ยไก่อ้แจ้ส้มยังเป็นพาหะถ่ายทอดโรคใบเหลืองต้นโทรม หรือกรีนนิง ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญที่สุดของส้มเขียวหวาน ทำให้โรคนี้นี้แพร่กระจายไปเกือบทุกแหล่งที่ปลูกส้ม เป็นสาเหตุให้ต้นส้มทรุดโทรมและตายในที่สุด

สำหรับ แนวทางป้องกัน แก้ไข ในระยะที่ส้มแตกตาและยอดอ่อน ควรหมั่นสำรวจเพลี้ยไก่อ้แจ้ส้มทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยการสุ่ม 5 ยอดต่อต้น จำนวน 10 - 20 ต้นต่อสวน

ในแหล่งที่มีการระบาดของโรคใบเหลืองต้นโทรม เมื่อพบเพลี้ยไก่อ้แจ้ส้มต้องทำการป้องกันกำจัดทันที โดยการพ่นสารฆ่าแมลงที่แนะนำ ได้แก่ อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โคลไทอะนิติน 16% เอสจี อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 15 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร