



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2569

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
โรคใบจุดสีน้ำตาล	1	เตือนชาวนา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! “โรคใบจุดสีน้ำตาล”	ThailandPlus
	2	เตือนชาวนา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! “โรคใบจุดสีน้ำตาล”	เดลินิวส์
	3	เตือนชาวนา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! “โรคใบจุดสีน้ำตาล”	ข่าวสด
	4	เตือนชาวนา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! “โรคใบจุดสีน้ำตาล”	MGRonline
	5	เตือนชาวนา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! “โรคใบจุดสีน้ำตาล”	Website AM1386
	6	เตือนชาวนา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! “โรคใบจุดสีน้ำตาล”	Facebook AM1386
	7	เตือนชาวนา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! “โรคใบจุดสีน้ำตาล”	เกษตรสัญจร
	8	เตือนชาวนา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! “โรคใบจุดสีน้ำตาล”	IG AM1386
เกลือทะเล	9	ก.เกษตร เดินหน้าพัฒนาระบบผลิตและการตลาดเกลือทะเลไทยใน ระดับพื้นที่ จ.เพชรบุรี สร้างโอกาสพัฒนาเกลือทะเลสู่ตลาด	NBTconnect
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ข้าว	10	เกษตรบุรีรัมย์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการผลิตข้าวเชิงอนุรักษ์ หนุนความหลากหลายทางชีวภาพและรักษานกกระเรียนพันธุ์ไทย	NBTconnect
T&V SYSTEM	11	เกษตรบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V SYSTEM หนุนเกษตรกรยั่งยืน ลดปัญหา PM 2.5	NBTconnect
อบรมพัฒนาเว็บไซต์	12	สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนและการอบรมพัฒนา เว็บไซต์ด้วย WordPress	NBTconnect

แปลงใหญ่	13	เกษตรอำเภอสีเกา จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตร แบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิิตภาพการผลิต จัดเวทีวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน ครั้งที่ 2 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านนาหละ	NBTconnect
----------	----	---	------------



เกษตรสัญจร

2 วัน · 🌐

...

อากาศเย็นระลอกใหม่มาแล้ว! เดือนชาวนารับมือ "โรคใบจุดสีน้ำตาล" ระบาดหนัก

กรมส่งเสริมการเกษตร ออกประกาศเตือนด่วนถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ! ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นี้ ประเทศไทยเตรียมเผชิญกับมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ ส่งผลให้หลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีอากาศหนาวเย็นและหมอกหนา ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของ "โรคใบจุดสีน้ำตาล" อย่างมาก!

สถานการณ์ล่าสุด:

พบการระบาดของโรคแล้วในหลายพื้นที่!

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จ.บุรีรัมย์ 10 ไร่, จ.สกลนคร 1 ไร่
- ภาคเหนือ: จ.กำแพงเพชร 36 ไร่
- ภาคใต้: จ.พัทลุง 34 ไร่

โรคใบจุดสีน้ำตาลคืออะไร? น่ากลัวแค่ไหน?

โรคนี้เกิดจากเชื้อราที่มากับลมและเมล็ดพันธุ์ มักพบมากในระยะข้าวแตกกอ สังเกตง่ายๆ ที่ใบข้าวจะมีจุดสีน้ำตาล รูปกลมหรือรี ขอบเหลือง ยิ่งปล่อยไว้นาน แผลยิ่งขยายใหญ่ ลามไปถึงเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เกิด "โรคเมล็ดด่าง" เมล็ดข้าวสกปรก เสื่อมคุณภาพ สีแล้วหักง่าย ขายไม่ได้ราคา!

วิธีป้องกันและกำจัด (ก่อนข้าวเสียหาย!):

1. สำรวจแปลงข้าว: หมั่นเดินตรวจแปลงนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. แخذ/คลุกเมล็ดพันธุ์: ก่อนปลูกให้แช่เมล็ดข้าวด้วย เชื้อราไตรโคเดอร์มา (1 กก. ต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อข้าว 100 กก.) หรือคลุกด้วย สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น แมนโคเซบ หรือ คาร์เบนดาซิม (3 กรัม ต่อข้าว 1 กก.)
3. ดูแลแปลงนา: กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม อย่าปล่อยให้แปลงรก
4. พบโรคแล้วทำไง?
 - ระบาดน้อย: พ่นด้วย เชื้อราไตรโคเดอร์มา (1 กก. ต่อน้ำ 100 ลิตร)
 - ระบาดรุนแรง: พ่นด้วย สารป้องกันกำจัดเชื้อรา ตามคำแนะนำของกรมการข้าว เช่น ไดฟิโนโคนาโซล + โปรพิโคนาโซล หรือ แมนโคเซบ หรือ คาร์เบนดาซิม (ดูอัตราการใช้ที่ฉลาก)
5. หลังเก็บเกี่ยว: โกลบฟาง ปลูกพืชปุ๋ยสด หรือพืชหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรโรค

อย่าปล่อยให้ "โรคใบจุดสีน้ำตาล" ทำลายข้าวของคุณ! ป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าแก้ทีหลัง!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด ใกล้บ้านท่าน

ที่มา: กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์: ข้าว

#อากาศเย็นระลอกใหม่ #เดือนชาวนา #โรคใบจุดสีน้ำตาล #โรคข้าว #ดูแลแปลงนา #ชาวนาไทย #กรมส่งเสริมการเกษตร #สร้างความรู้คนทำเกษตร #เทคนิคเกษตร #เกษตรกรไทย #เกษตรสัญจร



AM1386สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร

2 วัน · 🌐

...

เดือนชานา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! "โรคใบจุดสีน้ำตาล"

📌อ่านเพิ่มเติมในคอมเมนต์

#สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร #AM1386kHz #คลื่นเกษตรเพื่อคนเกษตร #กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ #กรมส่งเสริมการเกษตร #โรคใบจุดสีน้ำตาล



เดือนชานา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่

ระวัง!! "โรคใบจุดสีน้ำตาล"

👍 1

1 ความคิดเห็น แชร์ 3 ครั้ง

เตือนชาวนา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! “โรคใบจุดสีน้ำตาล”

2 กุมภาพันธ์ 2026 Thailandplus เกษตร - สิ่งแวดล้อม



- [Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [Line](#)

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฝ้าระวังโรคใบจุดสีน้ำตาล เนื่องจากพยากรณ์อากาศรายงานว่า ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มวลอากาศเย็นปานกลางระลอกใหม่เริ่มปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปในช่วงเช้า ทั้งตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรคของขอบใบจุดสีน้ำตาล ซึ่งสามารถแพร่ระบาดไปกับกระแสลมได้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงหรือมีหมอกหนา ซึ่งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2569 มีรายงานเริ่มพบการระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 ไร่ และจังหวัดสกลนครจำนวน 1 ไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 36 ไร่ และในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จำนวน 34 ไร่ จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมั่นสำรวจแปลงของตนเอง เพื่อจัดการโรคดังกล่าวได้ทันทั่วทั้ง



ลักษณะอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาล พบได้มากในช่วงข้าวระยะแตกกอ โดยสามารถสังเกตจากการแผลที่ใบข้าว
ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล รูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 มิลลิเมตร แผล
ที่พัฒนาเต็มทีขนาดประมาณ 1 – 2 x 4 – 10 มิลลิเมตร บางครั้งพบเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิมกระจายทั่วไปบน

ใบข้าว และแผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก กลายเป็นโรคเมล็ดด่างด้วย บางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรก เสื่อมคุณภาพ เมื่อนำไปสีข้าวสารจะหักงาย

การแพร่ระบาด เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลม และติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ควรเลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่อง ไม่พักดิน ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน จะเพิ่มการระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาล และเกิดการระบาดที่รุนแรงได้

การป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้ง หมั่นสำรวจแปลงข้าวของตนเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แซ่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว 100 กิโลกรัม เพื่อป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว หรือคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น แมนโคเซบ หรือคาร์เบนดาซิม อัตรา 3 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กิโลกรัมหมั่นกำจัดวัชพืชภายในนา ดูแลแปลงให้สะอาด และใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร หากพบการระบาดรุนแรง เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราตามที่กรมการข้าว แนะนำ ได้แก่ ไดฟิโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล หรือ แมนโคเซบ หรือ คาร์เบนดาซิม อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลาก และหากสิ้นสุดฤดูกาลผลิตแล้วให้ไถกลบฟาง ปลูกพืชปุ๋ยสด หรือปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อตัดวงจร และช่วยลดความรุนแรงของโรคใบจุดสีน้ำตาล



อากาศเย็นระลอกใหม่ เดือนชานา ระวัง “โรคใบจุดสีน้ำตาล”

เดือนชานา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง “โรคใบจุดสีน้ำตาล” กรมส่งเสริมการเกษตร เน้นขั้นตอนการป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฝ้าระวังโรคใบจุดสีน้ำตาล เนื่องจากพยากรณ์อากาศรายงานว่า ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มวลอากาศเย็นปานกลางระลอกใหม่เริ่มปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปในช่วงเช้า ทั้งตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรคของขอบใบจุดสีน้ำตาล ซึ่งสามารถแพร่ระบาดไปกับกระแสลมได้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงหรือมีหมอกหนา ซึ่งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2569 มีรายงานเริ่มพบการระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 ไร่ และจังหวัดสกลนครจำนวน 1 ไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 36 ไร่ และในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จำนวน 34 ไร่ จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมั่นสำรวจแปลงของตนเอง เพื่อจัดการโรคดังกล่าวได้ทันทั่วทั้ง

ลักษณะอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาล พบได้มากในช่วงข้าวระยะแตกกอ โดยสามารถสังเกตจากอาการแผลที่ใบข้าว ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล รูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 มิลลิเมตร แผลที่พัฒนาเต็มที่ขนาดประมาณ 1 – 2 X 4 – 10 มิลลิเมตร บางครั้งพบเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิมกระจายทั่วไปบนใบข้าว และแผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก กลายเป็นโรคเมล็ดด่างด้วย บางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรก เสื่อมคุณภาพ เมื่อนำไปสีข้าวสารจะหักง่าย

การแพร่ระบาด เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลม และติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ควร
เลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่อง ไม่พักดิน หากการปรับปรุงบำรุงดิน จะเพิ่มการระบาดของโรค
ใบจุดสีน้ำตาล และเกิดการระบาดที่รุนแรงได้... สามารถติดตามได้ที่ :

KHAOSOD

ข่าวสด ONLINE



กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระวัง “โรคใบจุดสีน้ำตาล” หลังพยากรณ์อากาศรายงานมวลอากาศเย็นปานกลางระลอกใหม่ปกคลุมตอนบนของไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฝ้าระวังโรคใบจุดสีน้ำตาล เนื่องจากพยากรณ์อากาศรายงานว่า ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มวลอากาศเย็นปานกลางระลอกใหม่เริ่มปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปในช่วงเช้า

ทั้งตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรคของขอบใบจุดสีน้ำตาล ซึ่งสามารถแพร่ระบาดไปกับกระแสลมได้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงหรือมีหมอกหนา

ซึ่งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2569 มีรายงานเริ่มพบการระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 ไร่ และจังหวัดสกลนครจำนวน 1 ไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 36 ไร่ และในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จำนวน 34 ไร่

“จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมั่นสำรวจแปลงของตนเอง เพื่อจัดการโรครดงกล้าได้ทันทั่วทั้งที่”

ลักษณะอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาล พบได้มากในช่วงข้าวระยะแตกกอ โดยสามารถสังเกตจากอาการแผลที่ใบข้าว ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล รูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 มิลลิเมตร แผลที่พัฒนาเต็มที่ขนาดประมาณ $1-2 \times 4-10$ มิลลิเมตร

บางครั้งพบเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิมกระจายทั่วไปบนใบข้าว และแผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก กลายเป็นโรคเมล็ดด่างด้วย บางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรก เสื่อมคุณภาพ เมื่อนำไปสีข้าวสารจะหักง่าย

การแพร่ระบาด เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลม และติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ควรเลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่อง ไม่พักดิน ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน จะเพิ่มการระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาล และเกิดการระบาดที่รุนแรงได้

การป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้ง หมั่นสำรวจแปลงข้าวของตนเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แซ่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว 100 กิโลกรัม เพื่อป้องกันการเกิดโรครดงกล้าหรือคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

เช่น แมนโคเซบ หรือคาร์เบนดาซิม อัตรา 3 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กิโลกรัมหมั่นกำจัดวัชพืชภายในนา ดูแลแปลงให้สะอาด และใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร หากพบการระบาดรุนแรง เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราตามที่กรมการข้าวแนะนำ ได้แก่ ไคฟิโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล หรือ แมนโคเซบ หรือ คาร์เบนดาซิม อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลาก และหากสิ้นสุดฤดูกาลผลิตแล้วให้ไถกลบฟาง ปลูกพืชปุ๋ยสด หรือปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อตัดวงจร และช่วยลดความรุนแรงของโรคใบจุดสีน้ำตาล

กรมส่งเสริมการเกษตรชี้ต้น ก.พ.69 อากาศหนาว เตือนเกษตรกรระวังโรคใบจุดสีน้ำตาล

เผยแพร่: 2 ก.พ. 2569 11:28 ปรับปรุง: 2 ก.พ. 2569 11:28 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เฝ้าระวังโรคใบจุดสีน้ำตาล เนื่องจากพยากรณ์อากาศรายงานว่า ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มวลอากาศเย็นปานกลางระลอกใหม่เริ่มปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปในช่วงเช้า ทั้งตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรคของขอบใบจุดสีน้ำตาล ซึ่งสามารถแพร่ระบาดไปกับกระแสลมได้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงหรือมีหมอกหนา ซึ่งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2569 มีรายงานเริ่มพบการระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 ไร่ และจังหวัดสกลนครจำนวน 1 ไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 36 ไร่ และในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จำนวน 34 ไร่ จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมั่นสำรวจแปลงของตนเอง เพื่อจัดการ โรคดังกล่าวได้ทันทั่วทั้งที่



เตือนชาวนา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! “โรคใบจุดสีน้ำตาล”



เตือนชาวนา ต้นกุ่มภาพันธุ์รับมืออากาศเย็นระลอกใหม่ ระวัง!! “โรคใบจุดสีน้ำตาล”

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฝ้าระวังโรคใบจุดสีน้ำตาล เนื่องจากพยากรณ์อากาศรายงานว่า ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มวลอากาศเย็นปานกลางระลอกใหม่เริ่มปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปในช่วงเช้า ทั้งตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะต่อการแพร่ระบาดของโรคของขอบใบจุดสีน้ำตาล ซึ่งสามารถแพร่ระบาดไปกับกระแสลมได้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงหรือมีหมอกหนา ซึ่งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2569 มีรายงานเริ่มพบการระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 ไร่ และจังหวัดสกลนครจำนวน 1 ไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 36 ไร่ และในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จำนวน 34 ไร่ จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมั่นสำรวจแปลงของตนเอง เพื่อจัดการ โรคดังกล่าวได้ทันทั่วทั้ง





ลักษณะอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาล พบได้มากในช่วงข้าวระยะแตกกอ โดยสามารถสังเกตจากอาการแผลที่ใบข้าว ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล รูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 มิลลิเมตร แผลที่พัฒนาเต็มที่ขนาดประมาณ 1 – 2 x 4 – 10 มิลลิเมตร บางครั้งพบเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยคล้ายสนิมกระจายทั่วไปบนใบข้าว และแผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก กลายเป็นโรคเมล็ดดำด้วย บางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรก เสื่อมคุณภาพ เมื่อนำไปสีข้าวสารจะหักง่าย

การแพร่ระบาด เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลม และติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ควรเลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่อง ไม่พักดิน ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน จะเพิ่มการระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาล และเกิดการระบาดที่รุนแรงได้

การป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้ง หมั่นสำรวจแปลงข้าวของตนเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แหม่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว 100 กิโลกรัม เพื่อป้องกันการเกิดโรคง่าว หรือคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น แมนโคเซบ หรือคาร์เบนดาซิม อัตรา 3 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กิโลกรัมหมั่นกำจัดวัชพืชภายในนา ดูแลแปลงให้สะอาด และใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร หากพบการระบาดรุนแรง เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคใบจุดสีน้ำตาล พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราตามที่กรมการข้าวแนะนำ ได้แก่ ไคฟิโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล หรือ แมนโคเซบ หรือ คาร์เบนดาซิม อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลาก และหากสิ้นสุดฤดูกาลผลิตแล้วให้ไถกลบฟาง ปลูกพืชโยสศ หรือปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อตัดวงจร และช่วยลดความรุนแรงของโรคใบจุดสีน้ำตาล



เกษตรบุรีรัมย์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการผลิตข้าวเชิงอนุรักษ์ หนุนความหลากหลายทางชีวภาพและรักษานกกระเรียนพันธุ์ไทย



วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวนิกร สมมั่ง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายพลาด ฐานะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวในเขตพื้นที่หากินของนกกระเรียนพันธุ์ไทย

การประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่, สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์, ธุรกิจข้าวพีชครบวงจร ขนส่งและบริการเรือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น โดยมีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยวิถีเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม

ประเด็นสำคัญจากการประชุม

- การผลิตข้าวเชิงอนุรักษ์: มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

- การสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ: สร้างสมดุลระหว่างการผลิตทางการเกษตรและการอนุรักษ์สัตว์ป่า
- การอนุรักษ์นกกกระเรียนพันธุ์ไทย: ใช้พื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของนกกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากและมีคุณค่าทางนิเวศ
- ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน: การมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรกรและธุรกิจท้องถิ่นในการสนับสนุนภาคธุรกิจต่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้าง โมเดลการผลิตข้าวที่เชื่อมโยงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แต่ยังสร้างคุณค่าเชิงนิเวศและภาพลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะพื้นที่ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความยั่งยืน

เกษตรบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามระบบส่งเสริมการเกษตร **T&V SYSTEM** หนุนเกษตรกร
ยั่งยืน ลดปัญหา **PM 2.5**



วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 นางสาวนิกร สมมั่ง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายถนอมศักดิ์ พันธุ์ ห้วยน้ำกลุ่มอารักขาพืช และ นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ ห้วยน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร **T&V SYSTEM** ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่ติดตาม

1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
 - o กลุ่มแปลงใหญ่ผักบ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์
 - o กลุ่มแปลงใหญ่ผักบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านคู
2. การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
3. การส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาและพืชใช้น้ำน้อย

การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังใจเกษตรกรและให้คำแนะนำเชิงวิชาการ ในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาตอซังข้าว โดยเน้นการไถกลบตอซัง การปลูกพืชหลังนา และการส่งเสริมการใช้พืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

การติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายปฐมพงษ์ โนนไธสง เกษตรอำเภอนาโพธิ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริม การเกษตรประจำเดือนและการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วย **WordPress**



สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยประชุม ตามระบบส่งเสริมการเกษตรเพื่อประชุมวางแผน
แนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนและการอบรมพัฒนา
เว็บไซต์ด้วย **WordPress**

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยกรมส่งเสริม
การเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี นางสาวนันทิยา ม่านตา เกษตรอำเภอคำ
ชะอี เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 1/2569 ประจำเดือนมกราคม 2569 โดยมีนาย
วรรณลักษ์ ทองบุคดี เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม ตามระบบส่งเสริม
การเกษตรเพื่อประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ประจำเดือนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569

ก่อนหน้านี้ เกษตรอำเภอคำชะอี มอบหมายให้ นางสาวเรณู
มาศ สิทธิสวนจิก เข้าร่วมการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วย **WordPress** สำหรับ
หน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์สำนักงาน
เกษตรอำเภอ ทั้ง 14 อำเภอ ของจังหวัดเลย ได้รับการพัฒนาด้วย **WordPress** และ

เป็นรูปแบบ **Multisite** ซึ่งมีเว็บไซต์อำเภออยู่ภายใต้เว็บไซต์จังหวัด เป็นมาตรฐานเดียวกันสะดวกต่อการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์

และได้รับมอบหมายจากนายสุขสันต์ ไชยรถ นายอำเภอด่านซ้ายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

เกษตรอำเภอสีกา จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยน
ผลิตภาพการผลิต จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน ครั้งที่ 2 แปลงใหญ่ยางพาราบ้าน
นาหละ



วันนี้(จันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569) นางสาวสุนรรัตน์ ตรีกตรอง เกษตรอำเภอสีกา
มอบหมายให้ นางสาวจอมทอง ชัยภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอรณิช คะเนย์ และ นายไพโรจน์ เพชรจำรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทยสาขาสิเกา จัดกิจกรรมส่งเสริม
ระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต จัดเวทีวิเคราะห์ประเมิน
ศักยภาพ 5 ด้าน ครั้งที่ 2 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านนาหละ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2569 ณ ที่ทำการ
แปลงใหญ่ยางพาราบ้านนาหละ หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสีกา จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
และการสาธิต การแนะนำวิธีการใช้แบคทีเรีย **Bacillus subtilis** หรือ BS เพื่อ
ป้องกันและกำจัดโรคพืช และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสิเกาได้
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มชาวสวนยางและการรวมกลุ่มเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณหรือถ่ายทอดความรู้ ให้ข้อมูลขอรับการสงเคราะห์ สำหรับเกษตรกรสวนยาง ปี 2569 และการขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง รวมถึงการช่วยเหลือภัยพิบัติ และ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของโรคในยางพารา นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเสเกาได้มีการประชาสัมพันธ์ มาตรการ "งดเผา" พื้นที่เกษตรเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในช่วงวิกฤต (1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2569) ด้วย

ก.เกษตร เดินหน้าพัฒนาระบบผลิตและการตลาดเกลือทะเลไทยในระดับพื้นที่ จ.เพชรบุรี สร้างโอกาสพัฒนาเกลือทะเลสู่ตลาด



นายกฤษฎ์ อุตตมะเวทิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เกลือทะเล โดยมี นายสุริยะ คำปวง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงพื้นที่ ณ แปลงนาเกลือสุขยอดเกลือสมุทร ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์เกลือทะเล สื่อสารนโยบายและมาตรการแก้ไข ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของภาครัฐ ให้เกษตรกรได้รับทราบโดยตรง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาเชิงพื้นที่ จากเกษตรกรในพื้นที่การผลิตจังหวัดเพชรบุรี

ในที่ประชุมได้มีการหารือพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลไทยในระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งรายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดเกลือทะเลในพื้นที่ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เช่น การปูผ้าใบพลาสติก การใช้เครื่องจักรในการเก็บเกลือรถดูดเกลือ รถเข็นเกลือ รวมถึงนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการทำนาเกลือทะเล รวมทั้งมีการจัดการต้นทุน และประชาสัมพันธ์การตลาดและราคาขาย พร้อมทั้งปรับตัว

ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกลือทะเลรักษาความยั่งยืนเกลือทะเลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ทำนาเกลือทะเล จำนวน 18,731 ไร่ เกษตรกรผู้ผลิต จำนวน 238ครัวเรือน แปรรูปผลิต จำนวน 334 แปรรูป ซึ่งมีแนวทางการเพิ่มมูลค่าเกลือทะเลเพื่อหนีจากสงครามราคากับเกลือสินเธาว์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี