



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 25 กันยายน 2569

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
GREEN x EXPO 2027 YOKOHAMA	1	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รุดถกอธิบดีกระทรวงมหาดไทยที่ปรึกษา ณ กรุงโตเกียว เตรียมความพร้อมไทยลุย GREEN x EXPO 2027 YOKOHAMA	- X. กรมส่งเสริมการเกษตร
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แปลงใหญ่	2	เกษตรเชียงใหม่ ขับเคลื่อน “แปลงใหญ่พืชผัก” ฮอต ผสานวิถีวิถี-เกษตรปลอดภัย	- เว็บไซต์ เชียงใหม่นิวส์
	3	เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลบางสัก พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามหลักมาตรฐาน GAP อย่างเคร่งครัด	- เว็บไซต์ NBTConnect
ปาล์มน้ำมัน	4	เกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน “ระวังโรคลำต้นเน่า” พร้อมขอให้เกษตรกรควรใช้วิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน	- เว็บไซต์ NBTConnect
โรคลำต้นเน่าในสวนปาล์มน้ำมัน	5	เกษตรอำเภอเมืองตรัง แนะนำชาวสวนปาล์ม รับมือโรคลำต้นเน่าในสวนปาล์มน้ำมัน	- เว็บไซต์ NBTConnect

เกษตรเชียงใหม่ ขับเคลื่อน “แปลงใหญ่พืชผัก” ฮอด ผลิตวิถีลัวะ-เกษตรปลอดภัย

24 Sep 69



วันที่ 24 กันยายน 2569 นางสาวศรีโสภณ โกฏคำลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเสน่ห์ แสงคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ เกษตรอำเภอฮอด นายอโนวัฒน์ สุดชนะ ประธานแปลงใหญ่ และคณะ ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อม มอบใบวิสาห์กิจชุมชนแก่กลุ่มท่องเที่ยว ณ ที่ทำการกลุ่ม “ผักดอยโอเค” ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด เป็นหนึ่งใน 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูง โดยมีความสูงประมาณ 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี และมีชุมชนชาติพันธุ์ลัวะซึ่งดำรงวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน ทั้งการตีเหล็กและทำมีดลัวะ การทอผ้าและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ ถูย่ามลายตวน อาหารพื้นถิ่น เช่น พริกดำ ข้าวดอยลัวะ ตลอดจนงานหัตถกรรมลูกปัดและสร้อยเดือยไก่อ

อำเภอฮอดมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 163,855 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ลำไย ข้าว และพืชผัก โดยกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต จากเดิมที่พึ่งพาสารเคมี ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม มาสู่การผลิตพืชผักที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต

จุดเด่นของกลุ่ม คือ การรวมพลังของคนรุ่นใหม่ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิด เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ากับนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับวัด โดยพระอาจารย์กฤษณะชัย ปณฺญาวฑฒโน พร้อมกลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ ตลอดจนตัดยอดจากการปลูกพืชผักไปสู่การปลูกกาแฟ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

นอกจากนี้ กลุ่มยังได้นำอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ลัวะมาร้อยเรียงกับการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านอาหาร วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่คนในชุมชน ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนได้อย่างใกล้ชิด

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาการผลิตที่ปลอดภัย เชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรและชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการผลิตของกลุ่ม แปลงใหญ่ ได้ที่ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการกลุ่ม ตั้งอยู่บนถนนฮอด -แม่สะเรียง- แม่ฮ่องสอน หลักกิโลเมตรที่ 29 บนถนนหลวงหมายเลข 108 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-783-0289

เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลบางสัก พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามหลักมาตรฐาน GAP อย่างเคร่งครัด



นางบุญญาพร ภายเพชร เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวพชร เหล็นเรือง และนางสาวสุธีธร สุวรรณพน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน รองประธานแปลงใหญ่ พืชผักตำบลบางสัก ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยปัจจุบัน มีกิจกรรม ปลุกถั่วฝักยาว แดงกวา บวบ แดงโม แดงไทย และฟักทองพื้นที่ประมาณ 20ไร่ อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยได้เก็บเกี่ยวผลผลิต มาแล้ว ประมาณ 1 เดือน โดยแปลงดังกล่าวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวัน ซึ่งหากดูแล บำรุงรักษาต้นดี จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปได้อีกประมาณ 1 เดือน จำหน่าย ณ จุดจำหน่ายสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ บริเวณ ตลาดบางสัก และตลาดนาเกลือ อำเภอกันตัง

สำหรับถั่วฝักยาว แดงโม แดงกวาและฟักทองแปลงดังกล่าว ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ตรงตามมาตรฐาน ผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกร มีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง ได้มีการติดตามและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามหลักมาตรฐาน GAP อย่างเคร่งครัด และมีการสุ่มตรวจสอบพืชผักค้างในผลผลิตอยู่เสมอ เพื่อสร้างปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค สินค้าเกษตรของกลุ่มฯ มี 4 ชนิดที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ได้แก่ ถั่วฝักยาว แดงโม แดงกวา และฟักทอง หากท่านใดสนใจสินค้าเกษตรแปลงใหญ่พืชผักตำบลบางสัก สามารถติดต่อได้ที่ นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน โทรศัพท์ 098-8923791

เกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน "ระวังโรคลำต้นเน่า" พร้อมขอให้เกษตรกรควรใช้วิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน



ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ

ฉบับที่ 15 ปี 2569 / วันที่ 23 กันยายน 2569

เกษตรหาดสำราญ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน "ระวังโรคลำต้นเน่า"

โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา *Ganoderma boninense* เชื้อราชนิดนี้กระจายอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเริ่มแพร่กระจายมายังประเทศไทย โดยการระบาดของเชื้อรา *Ganoderma boninense* ถือว่ามีความรุนแรง เพราะต้นพืชที่ติดเชื้อมักจะตาย และไม่มีทางรักษา โดยพืชที่เป็นแหล่งอาศัย ได้แก่ พืชสกุลต้น หมากสง สนทะเล พืชสกุลค้อ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และพืชสกุลปาล์ม เป็นต้น

นายณาคณ พรหมเพ็ญ เกษตรอำเภอหาดสำราญ กล่าวว่า ในปาล์มน้ำมันที่มีอาการมากแล้ว อาการของต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค ใบด้านล่างจะเหลือง ใบยอดมีจุดสีเหลือง ใบไม่คลี่ ยอดอ่อนพับตัวลงและเริ่มเน่า ต่อมาต้นจะโตช้า รากบริเวณโคนต้น จะเริ่มแห้งและเน่า และสุดท้ายมีดอกเหี่ยวตาย (ลักษณะคล้ายเห็ดหลินจือ) งอกออกมาจากโคนต้น โดยหลังจากแสดงอาการแล้ว ปาล์มเล็กจะตายภายใน 6-12 เดือน และปาล์มใหญ่จะยืนต้นตายภายใน 2-3 ปี โดยหากมีการติดเชื้อมากกว่า 20% ของพื้นที่ ถือว่าไม่มีความคุ้มค่าต่อการทำสวนปาล์มน้ำมัน จึงขอให้เกษตรกรควรใช้วิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสานโดยมีวิธีป้องกันกำจัด ดังนี้

1. เพาะทำลายดินปาล์มที่เป็นโรคให้หมด และอย่าเคลื่อนย้ายดินปาล์มที่เป็นโรค
2. ข่ายเชื่อบนพืชนับบริเวณต้นที่เป็นโรค ด้วยปูนขาว หรือโดโลไมท์
3. เพิ่มอินทรีย์วัตถุในสวน เช่น การใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก การวางกองทาง หรือการปลูกพืชคลุมดิน
4. จัดหรือรด เชื้อราไตรโคเดอร์มารอบโคนต้นปาล์มน้ำมัน
5. ปรับสภาพดิน ให้มีค่าพีเอช (กรด-ด่าง) ที่เหมาะสม ซึ่งควรอยู่ในช่วง 5.0 ถึง 5.5

วิธีป้องกัน "โรคลำต้นเน่า" ในปาล์มน้ำมัน

การเตรียมพื้นที่ก่อนปลูกปาล์มน้ำมัน

1. ทำจัดต่อเก่าของต้นปาล์มเดิมทิ้ง โดยการขุดหลุม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ความลึก 60 เซนติเมตร ไถพรวน แล้วคราดเอาเศษรากปาล์มเก่าออกให้หมด
2. สับต้นปาล์มเก่าให้เป็นชิ้นย่อย ๆ วางไว้เป็นแถว ห่างจากดินที่จะปลูกใหม่อย่างน้อย 2 เมตร
3. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อเร่งการย่อยสลายของเศษซากต้นปาล์มเก่า และช่วยในการหมุนเวียนธาตุอาหารพืช การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการควบคุมโรคลำต้นเน่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา (*Trichoderma spp.*) ถือเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ประสิทธิภาพสูง สามารถเข้าไปทำลายเชื้อราตัวกันได้ดีกว่าการใช้สารเคมี

หากเกษตรกรพบการระบาดของโรคหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ในวันและเวลาราชการ





ข่าว/ รายงาน : อรรพรรณ พานิก

📍 ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

☎ 080-05356239

🌐 <https://trang.doe.go.th/hatsamran>

📌 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง

โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราไกโนเดอร์มา (*Ganoderma bonibense*) เชื้อราชนิดนี้กระจายอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเริ่มแพร่กระจายมายังประเทศไทย โดยการระบาดของเชื้อไกโนเดอร์มา ถือว่ามีความรุนแรง เพราะต้นพืชที่ติดเชื้อแล้วจะตาย และไม่มีทางรักษาโดยพืชที่เป็นแหล่งอาศัย ได้แก่ พืชสกุลอ่อน หมากสง สนทะเล พืชสกุลค้อ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และพืชสกุลปาล์ม เป็นต้น

นายธนาคม พรหมเพ็ญ เกษตรอำเภอสรรคบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในปาล์มน้ำมันที่มีอาการมากแล้ว อาการของต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค ใบด้านล่างจะเหลือง ใบยอดมีจุดสีเหลือง ใบไม่คลี่ ยอดอ่อนพับตัวลงและเริ่มเน่า ต่อมาต้นจะโตช้า รากบริเวณโคนต้น จะเริ่มแห้งและเน่า และสุดท้ายมีดอกเห็ดไกโนเดอร์มา (ลักษณะคล้ายเห็ดหลินจือ) งอกออกมาจากโคนต้น โดยหลังจากแสดงอาการแล้ว ปาล์มเล็กจะตายภายใน 6-12 เดือน และปาล์มใหญ่จะยืนต้นตายภายใน 2-3 ปี โดยหากมีการติดเชื้อกระจายไปมากกว่า 20% ของพื้นที่ ถือว่าไม่มีความคุ้มค่าต่อการทำสวนปาล์มน้ำมัน จึงขอให้เกษตรกรควรใช้วิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสานโดยมีวิธีป้องกันกำจัด ดังนี้

1. เผาทำลายต้นปาล์มที่เป็นโรคให้หมด และอย่าเคลื่อนย้ายต้นปาล์มที่เป็นโรค
2. ฆ่าเชื้อบนผิวดินบริเวณต้นที่เป็นโรค ด้วยปูนขาว หรือโดโลไมท์
3. เพิ่มอินทรีย์วัตถุในสวน เช่น การใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก การวางกองทาง หรือการปลูกพืชคลุมดิน
4. ฉีดหรือรด เชื้อราไตรโคเดอร์มารอบโคนต้นปาล์มน้ำมัน
5. ปรับสภาพดิน ให้มีค่าพีเอช (กรด-ด่าง) ที่เหมาะสม ซึ่งควรอยู่ในช่วง 5.0 ถึง 5.5

วิธีป้องกัน “โรคลำต้นเน่า” ในปาล์มน้ำมัน

การเตรียมพื้นที่ก่อนปลูกปาล์มน้ำมัน

1. กำจัดตอเก่าของต้นปาล์มเดิมทิ้ง โดยการขุดหลุม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ความลึก 60 เซนติเมตร ไถพรวน แล้วคราดเอาเศษรากปาล์มเก่าออกให้หมด
2. สับต้นปาล์มเก่าให้เป็นชิ้นย่อย ๆ วางไว้เป็นแถว ห่างจากต้นที่จะปลูกใหม่อย่างน้อย 2 เมตร
3. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อเร่งการย่อยสลายของเศษซากต้นปาล์มเก่า และช่วยในการหมุนเวียนธาตุอาหารพืช

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการควบคุมโรคลำต้นเน่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา (*Trichoderma* spp.) ถือเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ประสิทธิภาพสูง สามารถเข้าไปทำลายเชื้อราด้วยกันได้ดีกว่าการใช้สารเคมี หากเกษตรกรพบการระบาดหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี ในวันและเวลาราชการ

เกษตรอำเภอเมืองตรัง แนะนำชาวสวนปาล์ม รับมือ โรคลำต้นเน่าในสวนปาล์มน้ำมัน



ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

ฉบับที่ 13 ปี 2569 : วันที่ 23 กันยายน 2569

เกษตรเมืองตรัง แนะนำชาวสวนปาล์ม รับมือ โรคลำต้นเน่าในสวนปาล์มน้ำมัน

โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรากาโนเดอร์มา โดยการระบาดของเชื้อกาโนเดอร์มา ถือว่ามีความรุนแรง เพราะหากระบาดรุนแรง จะไม่สามารถฟื้นฟูหรือรักษาให้กลับมาให้ผลผลิตได้แล้ว อาการของต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค ใบด้านล่างจะเหลือง ใบยอดมีจุดสีเหลือง ใบไม่คลี่ยอดอ่อนพับตัวลงและเริ่มเน่า ต่อมาต้นจะโค่น รากบริเวณโคนต้นจะเริ่มแห้งและเน่า และสุดท้ายมีดอกเห็ดกาโนเดอร์มา (ลักษณะคล้ายเห็ดหลินจือ) งอกออกมาจากโคนต้น



นางนิตยา จันทรประทีป เกษตรอำเภอเมืองตรัง กล่าวว่า แนวทางการควบคุมและป้องกันสามารถทำได้ เบื้องต้นดังนี้

1. ป้องกันก่อนปลูก : ใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันเชื้อราป้องกันหลุมก่อนปลูก และเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีความต้านทานโรคลำต้นเน่า
2. จัดการหลังเป็น : ขุดคุ้ยรอบต้นเพื่อตัดรากของปาล์มที่เป็นโรคไม่ให้ขยายไปยังต้นข้างเคียง กำจัดดอกเห็ดที่โคนต้นปาล์มนำไปเผาทำลาย กองดินพูนโคนต้นเพื่อป้องกันสปอร์เชื้อราแพร่กระจายไปยังปาล์มน้ำมันต้นอื่น และช่วยให้ปาล์มน้ำมันสร้างรากใหม่ทดแทนรากเก่าที่ถูกทำลาย



การกองดินพูนโคนต้น



สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

📍 223 ถนนตรัง - ปะเหลียน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
☎ 0 7529 0117
🌐 <https://trang.doae.go.th/mueang>
📌 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง



ข่าว : นิตยา คุปต์กาญจนกุล
รายงาน : ศราวุธ นวลเนาว์

โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรากาโนเดอร์มา โดยการระบาดของเชื้อกาโนเดอร์มา ถือว่ามีความรุนแรง เพราะหากระบาดรุนแรง จะไม่สามารถฟื้นฟูหรือรักษาให้กลับมาให้ผลผลิตได้แล้ว อาการของ ต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค ใบด้านล่างจะเหลือง ใบยอดมีจุดสีเหลือง ใบไม่คลี่ ยอดอ่อนพับตัวลงและเริ่มเน่า ต่อมา ต้นจะโตช้า รากบริเวณโคนต้น จะเริ่มแห้งและเน่า และสุดท้ายมีดอกเห็ดกาโนเดอร์มา (ลักษณะคล้ายเห็ดหลินจือ) งอกออกมาจากโคนต้น

นางนิตยา จันทรประทีป เกษตรอำเภอมืองตรัง กล่าวว่า แนวทางการควบคุมและป้องกันสามารถทำได้ เบื้องต้น ดังนี้

- 1.ป้องกันก่อนปลูก : ใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันเชื้อราป้องกันหลุมก่อนปลูก และเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีความต้านทานโรคลำต้นเน่า
- 2.จัดการหลังเป็น : ขุดคุ้ยรอบต้นเพื่อตัดรากของปาล์มที่เป็นโรคไม่ให้ขยายไปยังต้นข้างเคียง กำจัดดอกเห็ดที่โคนต้น ปาล์มนำไปเผาทำลาย กองดินพูนโคนต้นเพื่อป้องกันสปอร์เชื้อราแพร่กระจายไปยังปาล์มน้ำมันต้นอื่น และช่วยให้ ปาล์มน้ำมันสร้างรากใหม่ทดแทนรากเก่าที่ถูกทำลาย



กรมส่งเสริมการเกษตร
@DOAE_NEXT

...

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รุดทักอัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ณ กรุงโตเกียว เตรียมความพร้อมไทย
ลุย GREEN x EXPO 2027 YOKOHAMA 🌸🌸🌸
doanews.doae.go.th/archives/34597... 🌸🌸🌸 #กรมส่งเสริมการเกษตร



9:48 AM · Sep 24, 2026 · 60 Views



1

