



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

ตารางสรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2569

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
การฟื้นฟูหลังน้ำลด	1	เกษตรฯ ลงพื้นที่แนะนำขบวนการหลังน้ำท่วม ด้านพื้นที่ฝนตกชุกเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว	FB เรื่องเล่า ชาวเกษตร
	2		ThailandPlus
	3		X ThailandPlus
	4		FB เกษตรสัญจร
	5		BangkokBiz
ส่วนภูมิภาค			
อุทกภัย	6	เกษตรป่าโมกเร่งสำรวจน้ำท่วม 2 ตำบล เกษตรกรเสียหาย 9 ราย จ่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก	Siamrath
	7	เทศบาลตำบลพวา ขอแจ้งเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทางด้านพืชจากน้ำท่วม ยื่นขอรับความช่วยเหลือด่วน	FB สวท.จันทบุรี
กล้วยไม้	8	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เปิดโลกการเรียนรู้ พาเด็ก ๆ ทดลองตัดย้วยเนื้อเยื่อและอนุบาลกล้วยไม้คัทลียา	ThaiNews
โรคใช้ดิน	9	เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใช้ดินในช่วงหน้าฝน	ThaiNews
แมลงวันผลไม้	10	เกษตรอำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้และควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานด้วยระบบภูมิสารสนเทศ	ThaiNews
สถานการณ์น้ำ	11	เกษตรวังวิเศษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เกษตร ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	ThaiNews
แมลงวันผลไม้	12	เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง สำรวจประเมินสถานการณ์และควบคุมแมลงวันผลไม้	ThaiNews



19 ตุลาคม 2569

<https://www.facebook.com/share/p/1CAR2eWQ3u/>



เกษตรฯ ลงพื้นที่แนะนำชาวนาหลังน้ำท่วม

เกษตรฯ ลงพื้นที่แนะนำชาวนาหลังน้ำท่วม ด้านพื้นที่ฝนตกชุกเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อแปลงปลูกพืชหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนาข้าว ที่เสี่ยงเผชิญกับโรคไหม้ข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวติดตามสถานการณ์และสำรวจสังเกตอาการข้าวในนาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแปลงปลูกข้าวของตนได้ แนวทางการฟื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด ควรพิจารณาตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว ความลึกของน้ำ และระยะเวลาที่น้ำท่วมขัง เพื่อจัดการดินให้เหมาะกับการปลูกข้าว เนื่องจากในขณะที่น้ำท่วมขังในระดับสูง ดินจะอึดด้วยน้ำ ทำให้ดินขาดอากาศ และเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่าง ก่อให้เกิดสารประกอบอินทรีย์ เช่น กรดบูทริก และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเป็นพิษต่อต้นข้าว หลังน้ำลดควรระบายออกแล้วปล่อยให้ดินแห้ง ปริมาณอินทรีย์วัตถุจุลินทรีย์หน้าดิน ธาตุอาหารจะลดลงจากบริเวณที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไป ในพื้นที่ลุ่มต่ำจะมีธาตุอาหารพืชสะสมอยู่ในตะกอนเพิ่มขึ้นโดยระยะแรกๆ น้ำท่วมยอดข้าวเกิน 1-2 สัปดาห์ ข้าวแช่น้ำเน่าตาย กรณีข้าวโผล่พ้นผิวน้ำหลังน้ำลดจะทำให้ต้นข้าวหักล้ม การปรับปรุงดินควรลดระดับน้ำในแปลงนา โดยระบายน้ำออกให้ยอดโผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำลดสู่สภาวะปกติ ควบคุมระดับน้ำให้เหลือ 5-10 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยตามอัตราแนะนำ พร้อมฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์ พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ เมื่อข้าวอายุ 50 และ 60 วัน ข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสงที่ปลูกในดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ใน ระยะออกช่อ ดอก หรือ 30 วันก่อน

ข้าวออกรวง สำหรับพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะออกรวง เร่งระบายน้ำออก และไม่ควรรีใส่ปุ๋ยเคมี โดยเฝ้าระวังโรคและแมลง ระยะสุกแก่ เก็บเกี่ยวข้าวและตากให้แห้งโดยเร็ว เพื่อลดความชื้นของเมล็ด ทั้งนี้ กรณีน้ำท่วมเกิน 10 วัน ข้าวระยะต้นอ่อน ที่อายุน้อยกว่า 30 วันจะตาย รวมถึงข้าวที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด เมื่อน้ำลดลงจนแห้ง ให้เกษตรกรตอซังข้าวที่เหลืออยู่ในนา เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไป เร่งกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่นาและคันนาโดยรอบป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว ความเสี่ยงและลักษณะของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากฝนและความชื้นสูง ประกอบกับแปลงนาที่ต้นข้าวหนาแน่นทำให้อับลม เอื้อให้เกิดโรคไหม้ข้าวที่เกิดจากเชื้อรา *Piricularia oryzae* สามารถแพร่กระจายโรคไปยังพื้นที่ข้างเคียงเมื่อเกิดลมพัดแรง โดยลักษณะโรคไหม้ข้าว ระยะกล้าและแตกกอ สังเกตได้จากใบมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตาและมีสีเทากลางแผล หากรุนแรงจะเป็นพุ่มตายคล้ายถูกไฟไหม้ ระยะออกรวง จะสังเกตเห็นเมล็ดข้าวลีบ ส่วนเมล็ดแก่ใกล้เก็บเกี่ยวจะมีรอยแผลข้าวสีน้ำตาลบริเวณคอรวง ทำให้เปราะหัก รวงข้าวร่วงหล่นเสียหาย แนวทางการป้องกันและดูแลรักษาข้าว ควรประเมินสภาพแปลงนาและใส่ปุ๋ยในระยะเวลาเหมาะสมตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากพบอาการของโรคไหม้ข้าวให้พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร หากพบแผลซึ่งเป็นร่องรอยของโรคไหม้ข้าว 2-3 แผลต่อใบข้าว สามารถใช้สารเคมีเข้าควบคุมการระบาดโดยเร็ว



19 ตุลาคม 2026

<https://www.thailandplus.tv/archives/1065142>

สำหรับชาวชนบทและชนชั้นกลาง



วันที่ 21 สิงหาคม 2560

Home News TV Online Magazine Online Lifestyle

เกษตรกร ลงพื้นที่แนะนำชาวนาหลังน้ำท่วม ด้านพื้นที่ฝนตกชุกเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว

19 ต.ค. 2026 Thailandplus 0 Comments



เฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าว ภายหลังจากที่ประเทศไทยประสบกับน้ำท่วมอย่างหนัก เกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมได้เร่งระบายน้ำออกและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าว ซึ่งโรคไหม้ข้าวเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา *Piricularia oryzae* ที่สามารถแพร่กระจายโรคไปยังพื้นที่ข้างเคียงเมื่อเกิดลมพัดแรง โดยลักษณะโรคไหม้ข้าว ระยะกล้าและแตกกอ สังเกตได้จากใบมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตาและมีสีเทากลางแผล หากรุนแรงจะเป็นพุ่มตายคล้ายถูกไฟไหม้ ระยะออกรวง จะสังเกตเห็นเมล็ดข้าวลีบ ส่วนเมล็ดแก่ใกล้เก็บเกี่ยวจะมีรอยแผลข้าวสีน้ำตาลบริเวณคอรวง ทำให้เปราะหัก รวงข้าวร่วงหล่นเสียหาย แนวทางการป้องกันและดูแลรักษาข้าว ควรประเมินสภาพแปลงนาและใส่ปุ๋ยในระยะเวลาเหมาะสมตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากพบอาการของโรคไหม้ข้าวให้พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร หากพบแผลซึ่งเป็นร่องรอยของโรคไหม้ข้าว 2-3 แผลต่อใบข้าว สามารถใช้สารเคมีเข้าควบคุมการระบาดโดยเร็ว



แนวทางการป้องกันโรคไหม้ข้าว ควรสำรวจการระบาดของโรคไหม้ข้าว ความชื้นของน้ำ และระยะเวลาที่น้ำท่วมถึง เพื่อการตัดสินใจในการปลูกข้าว เนื่องจากในพื้นที่น้ำท่วมถึงระดับสูง ต้นข้าวจะอ่อนแอ ทำให้ต้นข้าวตายและเกิดโรคไหม้ข้าวได้ง่ายกว่าพื้นที่น้ำท่วมระดับต่ำ หรือพื้นที่น้ำท่วมระดับปานกลาง การป้องกันโรคไหม้ข้าวทำได้โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสม การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไหม้ข้าวได้ นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสมยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไหม้ข้าวได้ นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสมยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไหม้ข้าวได้ นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสมยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไหม้ข้าวได้



เกษตรกร ลงพื้นที่แนะนำชาวนาหลังน้ำท่วม ด้านพื้นที่ฝนตกชุกเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว

เกษตรกร ลงพื้นที่แนะนำชาวนาหลังน้ำท่วม ด้านพื้นที่ฝนตกชุกเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว Thailandplus เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อแปลงปลูกพืชหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนาข้าว ที่เสี่ยงเผชิญกับโรคไหม้ข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวติดตามสถานการณ์และสำรวจสังเกตอาการข้าวในนาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแปลงปลูกข้าวของตนได้ แนวทางการฟื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด ควรพิจารณาตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว ความลึกของน้ำ และระยะเวลาที่น้ำท่วมขัง เพื่อจัดการดินให้เหมาะกับการปลูกข้าว เนื่องจากในขณะที่มีน้ำท่วมขังในนา ระดับสูง ดินจะอิ่มด้วยน้ำ ทำให้ดินขาดอากาศ และเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่าง ก่อให้เกิดสารประกอบอินทรีย์ เช่น กรดบูทริก และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเป็นพิษต่อต้นข้าว หลังน้ำลดควรระบายออกแล้วปล่อยให้ดินแห้ง ปริมาณอินทรีย์วัตถุ จุลินทรีย์หน้าดิน ธาตุอาหารจะลดลงจากบริเวณที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไป ในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำจะมีธาตุอาหารพืชสะสมอยู่ในตะกอนเพิ่มขึ้นโดย ระยะแตกกอ น้ำท่วมยอดข้าวเกิน 1-2 สัปดาห์ ข้าวแช่น้ำเน่าตาย กรณีข้าวโผล่พ้นผิวน้ำ หลังน้ำลดจะทำให้ต้นข้าวหักล้ม การปรับปรุงดินควรลดระดับน้ำในแปลงนา โดยระบายน้ำออกให้ยอดโผล่พ้นน้ำ เมื่อน้ำลดสู่สภาวะปกติ ควบคุมระดับน้ำให้เหลือ 5-10 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยตามอัตราแนะนำ พร้อมฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์ พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ เมื่อข้าวอายุ 50 และ 60 วัน ข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสงที่ปลูกในดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ใน ระยะออกช่อ ดอก หรือ 30 วันก่อนข้าวออกรวง สำหรับพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะออกรวง เร่งระบายน้ำออก และไม่ควรรี้อายุเก็บเกี่ยว โดยเฝ้าระวังโรคและแมลง ระยะสุกแก่ เก็บเกี่ยวข้าวและตากให้แห้ง โดยเร็ว เพื่อลดความชื้นของเมล็ด ทั้งนี้ กรณีน้ำท่วมเกิน 10 วัน ข้าวระยะต้นอ่อน ที่อายุน้อยกว่า 30 วันจะตาย รวมถึงข้าวที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด เมื่อน้ำลดลงจนแห้ง ให้ไถกลบตอซังข้าวที่เหลืออยู่ในนา เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไป เร่งกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่นาและคันนาโดยรอบป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว ความเสี่ยงและลักษณะของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากฝนและความชื้นสูง ประกอบกับแปลงนาที่ต้นข้าวหนาแน่นทำให้อับลม เอื้อให้เกิดโรคไหม้ข้าวที่เกิดจากเชื้อรา *Pyricularia oryzae* สามารถแพร่กระจายโรคไปยังพื้นที่ข้างเคียงเมื่อเกิดลมพัดแรง โดยลักษณะโรคไหม้ข้าว ระยะกล้าและแตกกอ สังเกตได้จากใบมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตาและมีสีเทากลางแผล หากรุนแรงจะเป็นพุ่มตายคล้ายถูกไฟไหม้ ระยะออกรวง จะสังเกตเห็นเมล็ดข้าวลีบ ส่วนเมล็ดแก่ใกล้เก็บเกี่ยวจะมีรอยแผลข้าสีน้ำตาลบริเวณคอรวง ทำให้เปราะหัก รวงข้าวร่วงหล่นเสียหาย แนวทางการป้องกันและดูแลรักษา นาข้าว ควรประเมินสภาพแปลงนาและใส่ปุ๋ยในระยะเวลาเหมาะสมตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากพบอาการของโรคไหม้ข้าวให้พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร หากพบแผลซึ่งเป็นร่องรอยของโรคไหม้ข้าว 2-3 แผลต่อใบข้าว สามารถใช้สารเคมีเข้าควบคุมการระบาดโดยเร็ว



19 ตุลาคม 2569

<https://x.com/Thailandplus1/status/2112048050701312198>



Thailandplus
@Thailandplus1

...

เกษตรฯ ลงพื้นที่แนะนำชาวนาหลังน้ำท่วม ด้านพื้นที่ฝนตกชุกเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว



thailandplus.tv

เกษตรฯ ลงพื้นที่แนะนำชาวนาหลังน้ำท่วม ด้านพื้นที่ฝนตกชุกเฝ้า...


12:07 · 19 ต.ค. 2569 · 34 ยอดดู





19 ตุลาคม 2569

<https://www.facebook.com/share/p/19arsmGtzU/>



ด่วน! เปิดสูตรกู้ชีพ "นาข้าว" หลังน้ำลด สกิด "โรคไหม้ข้าว" ระบาดซ้ำก่อนพังกังทุ่ง! . สถานการณ์น้ำท่วมขังและ
ฝนตกชุกในภาคเหนือ ภาคกลาง และปริมณฑล กำลังสร้างวิกฤตให้กับแปลงนาข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร ออก
ประกาศเตือนชาวนาให้เร่งฟื้นฟูแปลงนาที่ถูกน้ำท่วมขัง พร้อมเฝ้าระวัง "โรคไหม้ข้าว" ที่มีระบาดหนักในช่วง
ความชื้นสูง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย . 📌 สูตรฟื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด (ทำตามนี้ ดินไม่เสีย ข้าวฟื้นตัวไว!) •
เร่งระบายน้ำลดสารพิษ น้ำที่ท่วมขังระดับสูงทำให้ดินขาดอากาศและเกิดก๊าซพิษ (กรดบูทริก และ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ต้องเร่งระบายน้ำออกให้ยอดข้าวโผล่พ้นน้ำ เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติให้ควบคุมระดับน้ำในแปลงเหลือ
เพียง 5-10 เซนติเมตร • ฉีดพ่นน้ำหมักบำรุงต้น ใช้น้ำหมักชีวภาพ (จากสารเร่งจุลินทรีย์ ปด.2) อัตรา 5 ลิตรต่อไร่
ฉีดพ่นเมื่อข้าวอายุ 50 และ 60 วัน . เทคนิคการใส่ปุ๋ยยูเรียให้ตรงจุด • ข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสง (ในพื้นที่ดินร่วน
เหนียว/ดินเหนียว) ใส่ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ในระยะออกดอก หรือ 30 วันก่อนข้าวออกรวง • ข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วง
แสง: ใส่ 20 กิโลกรัมต่อไร่ • ข้อห้ามเด็ดขาด! ใน "ระยะออกรวง" ให้เร่งระบายน้ำออกและ ห้ามใส่ปุ๋ยเคมี เพื่อเฝ้า
ระวังโรคและแมลง เมื่อถึงระยะสุกแก่ให้รีบเก็บเกี่ยวและตากแห้งเพื่อลดความชื้น • กรณีท่วมหนักจนข้าวตาย หาก
น้ำท่วมเกิน 10 วัน ในข้าวต้นอ่อนอายุไม่ถึง 30 วัน ให้เฝ้าสังเกตตอซึ่งเพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ย และเร่งถางหญ้าบนคัน
นาเพื่อตัดวงจรโรคและแมลงศัตรูพืช . ⚠️ เตือนภัย! ระวัง "โรคไหม้ข้าว" ถล่มแปลง สภาพอากาศชื้น ฝนตก

ประกอบกับแปลงนาที่หว่านข้าวหนาแน่นจนอับลม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขั้นต้นของเชื้อรา (Pyricularia oryzae) ซึ่งสามารถปลิวไปตามลมระยะ بادสู่แปลงข้างเคียงได้ . • จุดสังเกตอาการ ระยะกล้าและแตกกอ ใบจะมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา (ตรงกลางแผลสีเทา) หากรุนแรงต้นจะแห้งตายคล้ายถูกไฟไหม้ / ถ้าระบาดในระยะออกรวง คอรวงข้าวจะมีแผลข้าสีน้ำตาล ทำให้คอรวงเปราะหัก เมล็ดข้าวลีบและร่วงหล่น . • วิธีควบคุมและกำจัด 1. สายชีวภัณฑ์: พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร 2. สายเคมี: หากเดินสำรวจพบแผลโรคไหม้ข้าว 2-3 แผลต่อใบ ให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นควบคุมการระบาดทันที อย่าปล่อยให้ลาม! . เกษตรกรผู้ปลูกข้าวควรหมั่นลงพื้นที่สำรวจแปลงนาอย่างใกล้ชิด ใส่ปุ๋ยตามอัตราแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดการผลผลิตให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้



เกษตรกร ลงพื้นที่แนะนำชาวนาหลังน้ำท่วม ด้านพื้นที่ฝนตกชุกเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อแปลงปลูกพืชหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนาข้าว ที่เสี่ยงเผชิญกับโรคไหม้ข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวติดตามสถานการณ์และสำรวจสังเกตอาการข้าวในนาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแปลงปลูกข้าวของตนได้ แนวทางการฟื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด ควรพิจารณาตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว ความลึกของน้ำ และระยะเวลาที่น้ำท่วมขัง เพื่อจัดการดินให้เหมาะกับการปลูกข้าว เนื่องจากในขณะนี้น้ำท่วมขังในระดับสูง ดินจะอิ่มด้วยน้ำ ทำให้ดินขาดอากาศ และเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่าง ก่อให้เกิดสารประกอบอินทรีย์ เช่น กรดบูทริก

และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเป็นพิษต่อต้านข้าว หลังน้ำลดควรรีบระบายออกแล้วปล่อยให้ดินแห้ง ปริมาณอินทรีย์วัตถุ จุลินทรีย์หน้าดิน ธาตุอาหารจะลดลงจากบริเวณที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไป ในที่พื้นที่ลุ่มต่ำจะมีธาตุอาหารพืชสะสม อยู่ในตะกอนเพิ่มขึ้นโดยระยะแตกกอ น้ำท่วมยอดข้าวเกิน 1-2 สัปดาห์ ข้าวแช่น้ำเน่าตาย กรณีข้าวโผล่พ้นผิวน้ำ หลังน้ำลดจะทำให้ต้นข้าวหักล้ม การปรับปรุงดินควรลดระดับน้ำในแปลงนา โดยระบายน้ำออกให้ยอดโผล่พ้นน้ำ เมื่อน้ำลดสู่สภาวะปกติ ควบคุมระดับน้ำให้เหลือ 5-10 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยตามอัตราแนะนำ พร้อมฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์ พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ เมื่อข้าวอายุ 50 และ 60 วัน ข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสงที่ปลูกในดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ใน ระยะออกช่อ ดอก หรือ 30 วันก่อนข้าวออกรวง สำหรับพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะออกรวง เร่งระบายน้ำออก และไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมี โดยเฝ้าระวังโรคและแมลง ระยะสุกแก่ เก็บเกี่ยวข้าวและตากให้แห้งโดยเร็ว เพื่อลดความชื้นของเมล็ด ทั้งนี้ กรณีน้ำท่วมเกิน 10 วัน ข้าวระยะต้นอ่อน ที่อายุน้อยกว่า 30 วันจะตาย รวมถึงข้าวที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด เมื่อน้ำลดลงจนแห้ง ให้เฝ้าระวังเชื้อราที่เหลื้อยู่ในนา เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไป เร่งกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่นาและคันนาโดยรอบป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว ความเสี่ยงและลักษณะของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากฝนและความชื้นสูง ประกอบกับแปลงนาที่ต้นข้าวหนาแน่นทำให้อับลม เอื้อให้เกิดโรคไหม้ข้าวที่เกิดจากเชื้อรา *Pyricularia oryzae* สามารถแพร่กระจายโรคไปยังพื้นที่ข้างเคียงเมื่อเกิดลมพัดแรง โดยลักษณะโรคไหม้ข้าว ระยะกล้าและแตกกอ สังเกตได้จากใบมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตาและมีสีเทากลางแผล หากรุนแรงจะเป็นพุ่มตายคล้ายถูกไฟไหม้ ระยะออกรวง จะสังเกตเห็นเมล็ดข้าวลีบ ส่วนเมล็ดแก่ใกล้เก็บเกี่ยวจะมีรอยแผลซ้ำสีน้ำตาลบริเวณคอรวง ทำให้เปราะหัก รวงข้าวร่วงหล่นเสียหาย แนวทางการป้องกันและดูแลรักษานาข้าว ควรประเมินสภาพแปลงนาและใส่ปุ๋ยในระยะเวลาเหมาะสมตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากพบอาการของโรคไหม้ข้าวให้พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร หากพบแผลซึ่งเป็นร่องรอยของโรคไหม้ข้าว 2-3 แผลต่อใบข้าว สามารถใช้สารเคมีเข้าควบคุมการระบาดโดยเร็ว

เกษตรอำเภอแม่แจ่มเร่งสำรวจน้ำท่วม 2 ตำบล เกษตรกรเสียหาย 9 ราย จ่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก

ภูมิภาค - 19 ต.ค. 2569 - 19:00 น.

Facebook Twitter Line YouTube



เกษตรอำเภอแม่แจ่ม จ.อ่างทอง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2569 ใน 2 ตำบล พบเกษตรกรได้รับความเสียหาย 9 ราย พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาความช่วยเหลือ และนำแนวทางฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำลด และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

วันที่ 19 ตุลาคม 2569 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) ระดับหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2569 ในพื้นที่ 2 ตำบลของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดอ่างทอง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

เกษตรอำเภอแม่แจ่ม จ.อ่างทอง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2569 ใน 2 ตำบล พบเกษตรกรได้รับความเสียหาย 9 ราย พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาความช่วยเหลือ และนำแนวทางฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำลด และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน วันที่ 19 ตุลาคม 2569 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) ระดับหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2569 ในพื้นที่ 2 ตำบลของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดอ่างทอง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ - โฆษณา - สยามรัฐออนไลน์ ทันทุกสถานการณ์ข่าว ตรงไปตรงมา เพื่อประชาชนติดตามผ่าน LINE ผลการตรวจประเมินพบว่า ตำบลบางปลากด มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 5 ราย พื้นที่เสียหาย 4 ไร่ 2 งาน และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 4 ไร่ ส่วน ตำบลบางเสด็จ มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 4 ราย พื้นที่เสียหาย 17 ไร่ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 2 งาน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือแก่เกษตรกร รวมถึงแนะนำการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในรอบถัดไป เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและใช้ประกอบการพิจารณาความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน และช่วยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยสามารถวางแผนฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกและกลับมาประกอบอาชีพได้ภายหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลาย



19 ตุลาคม 2569

<https://www.facebook.com/share/p/19SGyibWPu/>



เทศบาลตำบลพวา ขอแจ้งเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทางด้านพืชจากน้ำท่วม ยื่นขอรับความช่วยเหลือด่วน

 เอกสารที่ต้องใช้: 1. สำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร (ถ้ามี) 2. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน 3.

รูปถ่ายน้ำท่วมแปลงพืช (อย่างน้อย 2 ภาพ) 4. แบบคำร้อง กษ. 01 5. สำเนาสมุดบัญชี ธ.ก.ส. เท่านั้น 

ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็ยื่นได้! (แจ้งระบุ "ไม่ได้ขึ้นทะเบียน" ในแบบคำร้อง)  ยื่นได้ที่:

เทศบาลตำบลพวา หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว  ยื่นภายใน: 22 ตุลาคม 2569 นี้เท่านั้น! -----

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพวา  โทรศัพท์ 039 - 490425

[illegible]

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เปิดโลกการเรียนรู้ พาเด็ก ๆ ทดลองตัดย้ายเนื้อเยื่อและอนุบาลกล้วยไม้คัทลียา นางวรรณพรหมบุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้(19 ตุลาคม 2569) ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็ก ๆ จาก PLAY Language & Learning Space ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมครั้งนี้ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้คัทลียา โดยได้ทดลองปฏิบัติในขั้นตอนการตัดย้ายเนื้อเยื่อภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ พร้อมเรียนรู้การอนุบาลต้นกล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการขยายพันธุ์พืชและการดูแลต้นกล้าให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชแล้ว เด็ก ๆ ยังได้ฝึกทักษะการใช้มืออย่างประณีต การสังเกต การคิดอย่างเป็นขั้นตอน และการเรียนรู้ผ่านการทดลองจริง กิจกรรมนี้ช่วยเปลี่ยนเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่อาจดูซับซ้อนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมปลูกฝังความรักธรรมชาติและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรตั้งแต่วัยเยาว์ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง มุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ได้ลงมือทำจริง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย และวางรากฐานสู่การพัฒนาทักษะและนวัตกรรมทางการเกษตรในอนาคต



nbt connect		
317,238	0	46,274,224
จำนวนข่าว	วิดีโอใหม่	จำนวนคนอ่าน
แท็กที่กำลังได้รับความนิยม		
1. ความนิยม	#เล่าเรื่องเมืองตรัง	12,169 ยอดชม
2. ความนิยม	#มาตรการรับมือฤดูฝน	6,919 ยอดชม
3. ความนิยม	#การบริหารจัดการน้ำ	5,530 ยอดชม
4. ความนิยม	#จังหวัดสุรินทร์	2,199 ยอดชม
5. ความนิยม	#prdtani	2,081 ยอดชม

เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคไข้อีดำไข้อีใสในช่วงหน้าฝน

โรคเมลิออยด์ หรือ เมลิออยโดสิส (Mlioidosis) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ไข้อีดำไข้อีใส” เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า *Burkholderia pseudomallei* พบได้ทั่วไปในดินและน้ำ เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้หลายช่องทาง ทั้งทางสัมผัสผ่านบาดแผลที่ผิวหนัง การหายใจเอาฝุ่นละอองที่มีเชื้อ หรือการบริโภคอาหารและน้ำที่ได้รับการปนเปื้อน

อาการที่สังเกตได้ - มีไข้สูง หนาวสั่น - ไอ เจ็บหน้าอก - ปวดเมื่อยตัว อ่อนเพลีย - มีฝี หนอง หรือบาดแผลตามผิวหนัง นางบุญญาพร กายเพชร เกษตรอำเภอกันตัง กล่าวว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากต้องสัมผัสกับดินและน้ำโดยตรงเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หรือเกิดน้ำท่วมขัง หากมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ธาลัสซีเมีย และโรคไตวายเรื้อรัง ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง ขอให้เกษตรกรป้องกันตนเองจากโรคไข้อีดำไข้อีใส ดังนี้ 1. สวมรองเท้าบูทยางกันน้ำ ถุงมือยาง เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว/ชุดกันเปื้อน เมื่อต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือเมื่อสัมผัสดินและน้ำโดยตรง 2. ล้างมือ ล้างเท้า และอาบน้ำทันทีด้วยสบู่และน้ำสะอาด หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 3. ดูแลความสะอาดของบาดแผลที่ผิวหนัง หากมีบาดแผลหรือรอยขีดข่วน ควรทำความสะอาดด้วยสบู่และ น้ำสะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อ และปิดแผลด้วยผ้าสะอาดหรือพลาสติก เพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกาย 4. ดื่มน้ำสะอาดที่ต้มสุก หรือน้ำบรรจุขวด 5. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด และหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่สัมผัสกับดินหรือน้ำที่ปนเปื้อน




วันที่ 19 ตุลาคม 2569 นางสาวรุ่งทิพา รักษาแก้ว เกษตรอำเภอรักขะ มอบหมายให้นางสาวปนัดดา จินประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้และควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานด้วยระบบภูมิสารสนเทศ โดยวางกับดักสไตเนอร์เพื่อล่อตัวเต็มวัยแมลงวันผลไม้ที่ระบาดในพื้นที่ตำบลควนเมา อำเภอรักขะ จังหวัดตรัง

ส่วนเรื่องการควบคุมแมลงวันผลไม้ (แมลงวันทอง) ที่ได้ผลดีที่สุดควรใช้วิธีผสมผสาน (IPM) เพื่อตัดวงจรชีวิต เริ่มจากการ ห่อผลไม้ ด้วยถุงกระดาษหรือพลาสติกตั้งแต่ผลยังอ่อน การห่อ

nbt		
317,240	0	46,274,242
จำนวนข่าว	วิดีโอทั้งหมด	จำนวนคนอ่าน

แท็กที่กำลังได้รับความนิยม	
1.ความนิยม	#น้ำแข็งเมืองตรัง
12,170 ยอดชม	
2.ความนิยม	#มาตรการรับมือฤดูฝน
6,919 ยอดชม	
3.ความนิยม	#การบริหารจัดการน้ำ
5,530 ยอดชม	
4.ความนิยม	##จังหวัดสุรินทร์
2,199 ยอดชม	
5.ความนิยม	#pudtani
2,081 ยอดชม	

เกษตรอำเภอรักขะ จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้และควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานด้วยระบบภูมิสารสนเทศ วันที่ 19 ตุลาคม 2569 นางสาวรุ่งทิพา รักษาแก้ว เกษตรอำเภอรักขะ มอบหมายให้นางสาวปนัดดา จินประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้และควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานด้วยระบบภูมิสารสนเทศ โดยวางกับดักสไตเนอร์เพื่อล่อตัวเต็มวัยแมลงวันผลไม้ที่ระบาดในพื้นที่ตำบลควนเมา อำเภอรักขะ จังหวัดตรัง สำหรับการควบคุมแมลงวันผลไม้ (แมลงวันทอง) ที่ได้ผลดีที่สุดควรใช้วิธีผสมผสาน (IPM) เพื่อตัดวงจรชีวิต เริ่มจากการ ห่อผลไม้ ด้วยถุงกระดาษหรือพลาสติกตั้งแต่ผลยังอ่อน การห่อผล เป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 100% สำหรับผลไม้เดี่ยว เช่น มะม่วง ฝรั่ง ชมพู โดยใช้ถุงห่อที่ระบายน้ำได้ดี (เช่น ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกเจาะรูกันถุง) ควรห่อตั้งแต่ผลยังมีขนาดเล็ก , การใช้กับดักสารล่อ (เมธิลยูจินอล) ล่อตัวผู้ กับดักเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดจำนวนประชากรแมลงวันผลไม้ก่อนที่มันจะเข้าทำลายผลผลิต และการ ทำลายผลร่วง โดยการเก็บใส่ถุงมิดชิดตากแดดเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนกลายเป็นดักแด้ในดิน วิธีเขตกรรม และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์การเก็บกวาดผลไม้ร่วงหล่นและเน่าเสียออกจากสวนทุกวันเป็นสิ่งสำคัญมาก ผลไม้เหล่านี้มักมีหนอนแมลงวันผลไม้อยู่ด้านใน หากปล่อยทิ้งไว้ หนอนจะไชลงไปเข้าดักแด้ในดินและกลายเป็นตัวเต็มวัย



วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2569 นางสาวเพ็ญพร แสงแก้ว เกษตรอำเภอวังวิเศษ พร้อมด้วย นางสาว ศศิธร รักษ์เจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายดินทร์ ภัคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เกษตร ตำบลวังมะปราง เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้น ณ พื้นที่ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีพื้นที่เกษตรที่โดนน้ำท่วม สวนปาล์มน้ำท่วมบริเวณที่ปลูกกับแหล่ง

317,241	0	46,274,278
จำนวนข่าว	วิดีโอใหม่	จำนวนคนอ่าน
แท็กที่กำลังได้รับความนิยม		
1. ความนิยม	#เล่าเรื่องเมืองตรัง	12,172 ยอดชม
2. ความนิยม	#มาตรการรับมือฤดูฝน	6,919 ยอดชม
3. ความนิยม	#การบริหารจัดการน้ำ	5,530 ยอดชม
4. ความนิยม	#จังหวัดสุรินทร์	2,199 ยอดชม
5. ความนิยม	#prdtani	2,081 ยอดชม

เกษตรวังวิเศษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เกษตร ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2569 นางสาวเพ็ญพร แสงแก้ว เกษตรอำเภอวังวิเศษ พร้อมด้วย นางสาวศศิธร รักษ์เจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายดินทร์ ภัคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เกษตร ตำบลวังมะปราง เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้น ณ พื้นที่ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีพื้นที่เกษตรที่โดนน้ำท่วม สวนปาล์มน้ำท่วมบริเวณที่ปลูกกับแหล่งน้ำที่ยังไม่มีพื้นที่การเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิง (พืชในแปลงยังไม่ยืนต้นตาย) ต้องดูสถานการณ์หลังน้ำลดลงว่าส่งผลต่อต้นพืชให้เสียหายหรือไม่ โดยปกติแล้ว ปาล์มน้ำมันสามารถทนน้ำท่วมขังได้นานถึง 15-30 วัน โดยที่ต้นยังสามารถฟื้นตัวได้หลังน้ำลด ถ้าน้ำท่วมขังประมาณ 15-30 วัน (เฉพาะโคนต้น): ต้นปาล์มจะชะงักการเจริญเติบโต และทะลายปาล์มที่ออกมาในช่วงนั้นอาจเน่าเสียหายทั้งหมด แต่ต้นปาล์มส่วนใหญ่สามารถฟื้นตัวได้หลังน้ำลด ถ้าน้ำท่วมขังนานกว่า 30-60 วัน (เฉพาะโคนต้น): ต้นปาล์มจะทรุดโทรมอย่างมาก ระบบรากจะเสียหายมากกว่า 50% และปริมาณธาตุอาหารในดินจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถ้าน้ำท่วมถึงยอด: หากน้ำท่วมมิดยอดเป็นเวลานาน (โดยเฉพาะเกิน 30 วัน) ต้นปาล์มส่วนใหญ่มีโอกาสตายหรือทรุดโทรมอย่างมาก ทั้งนี้หลังจากน้ำลดจะสำรวจความเสียหายของแปลงเกษตรกร เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบแก่เกษตรกรต่อไป

