



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 27 กันยายน 2569

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ปาล์มน้ำมัน	1	เกษตรอำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจอาการผิดปกติของปาล์มน้ำมันในแปลง พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในการเก็บตัวอย่างส่วนของพืชที่แสดงอาการและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไปตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของอาการผิดปกติให้ชัดเจน	เว็บไซต์ NBT Connex
	2	เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระวังโรคลำต้นเน่า (เชื้อรา Ganoderma boninense) ในปาล์มน้ำมัน	เว็บไซต์ NBT Connex
	3	สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เตือนชาวสวนปาล์ม ระวังโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน	เว็บไซต์ NBT Connex
แปลงใหญ่	4	เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อน แปลงใหญ่พืชผัก สร้างรายได้ ในพื้นที่อำเภอฮอด	เว็บไซต์ radiochiangmai

เกษตรอำเภอเสนา จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่สำรวจอาการผิดปกติของปาล์มน้ำมันในแปลง พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในการเก็บตัวอย่างส่วนของพืชที่แสดงอาการและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไปตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของอาการผิดปกติให้ชัดเจน



นางสาวสุนรัตน์ ตรีกตรอง เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วย นายไพโรจน์ เพชรจำรัส และ นางสาวอรณิษ คะณีย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจอาการผิดปกติของปาล์มน้ำมันในแปลงของนายวันชัย เกลี้ยงช่วย เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยแปลงปลูกปาล์มน้ำมันมีพื้นที่ประมาณ 55 ไร่ จำนวน 1,200 ต้น อายุประมาณ 1 ปี 2 เดือน

จากการสำรวจพบว่า ปาล์มน้ำมันบางส่วนแสดงอาการยอดบิด หัก และแห้ง โดยเริ่มพบอาการมาประมาณ 2 เดือน และพบต้นที่มีอาการประมาณร้อยละ 10 ของแปลง เกษตรกรได้ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราแล้วจำนวน 3 ครั้ง แต่อาการผิดปกติยังคงปรากฏอยู่ สำหรับการจัดการแปลง เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และสูตร 13-13-21 ทุก 2 เดือน ในอัตราประมาณ 300-450 กรัมต่อต้น เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้สำรวจและบันทึกลักษณะอาการของต้นปาล์มน้ำมัน พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในการเก็บตัวอย่างส่วนของพืชที่แสดงอาการและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไปตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของอาการผิดปกติให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม

#เล่าเรื่องเมืองศรี

12,706 ยอดชม

2.ความนิยม

#กระทรวงมหาดไทย

4,796 ยอดชม

3.ความนิยม

#กองสารนิเทศ สป.มท.

4,031 ยอดชม

4.ความนิยม

#มาตรการรับมือฤดูฝน

2,275 ยอดชม

5.ความนิยม

#จ.ชัยภูมิ

2,104 ยอดชม

เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระวังโรคลำต้นเน่า (เชื้อรา *Ganoderma boninense*) ในปาล์มน้ำมัน



ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง

ฉบับที่ 20 ปี 2569
วันที่ 25 กันยายน 2569

เกษตรกันตัง เตือนการระวัง
โรคลำต้นเน่า
(เชื้อรา *Ganoderma boninense*)
ในปาล์มน้ำมัน

นางบุญญาพร กายเพชร เกษตรอำเภอกันตังกล่าวว่า ชาวสวนปาล์มในเขตจังหวัดภาคใต้ได้รับความเสียหายสูญเสียรายได้จากต้นปาล์ม ยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยมีการระบาดของเชื้อรา กาโนเดอร์มา โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป หรือปาล์มที่ปลูกซ้ำแปลงเดิม



อาการของโรค



ทางใบล่าง

- มีสีซีดเหลือง แห้งตาย และหักพับห้อยลงมารอบลำต้น



ทางยอด

- ใบยอดใหม่คลี่ช้าหรือไม่คลี่ ต้นเติบโตช้า



โคนต้น

- เปลือกไม้บริเวณโคนต้นผุ หรือกลวง ใช้ไม้เคาะจะมีเสียงโปร่งไม่แน่นทึบ



ระยะลุกลาม

- จะพบดอกเห็ดขนาดใหญ่ สีส้มแดงงอกคล้ายเห็ดหลินจือ ขึ้นที่โคนต้นหรือราก ซึ่งเป็นระยะที่ปาล์มถูกทำลายรุนแรงแล้ว

การป้องกันและกำจัด



ขุดทำลาย

- ขุดโคนและขุดรากต้นปาล์มที่เป็นโรคออกให้หมด จากนั้นนำไปเผาทำลาย ห้ามเคลื่อนย้ายก่อนฝังหรือที่เป็นโรคไปแปลงอื่น



ฆ่าเชื้อในดิน

- ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ บริเวณหลุมปลูกเดิม เพื่อปรับสภาพดิน และฆ่าเชื้อรา



จัดการแปลง

- เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน เช่น ปุ๋ยหมัก หรือวางทางใบ ปาล์มตามแนวแถวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน



เฝ้าระวัง

- หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสวนปาล์มเก่าที่มีการปลูกใหม่ในรอบที่ 2 หรือ 3 ซึ่งมีความเสี่ยงสูง

ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย *Bacillus* sp. (B-Palm1)

ควบคุมและป้องกัน โรคลำต้นเน่าหรือโรคโคนเน่าในปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา *Ganoderma* (กาโนเดอร์มา)




1/1 ถ.เลื่อน
อ.กันตัง จ.ตรัง

☎ 075-251742

🌐 <https://trang.doae.go.th/kantang>

📱 เฟสบุ๊ค
ส.อ.เกษตรอำเภอกันตัง จ.ตรัง 2569

👤 ข่าว/ รายงาน :
บุญญาพร อัครภักดิ์

nbt connect		
311,813	0	42,975,002
จำนวนข่าว	วิดีโอทั้งหมด	จำนวนคนอ่าน

แท็กที่กำลังได้รับความนิยม	
1.ความนิยม	#เล่าเรื่องเมืองตรัง
	12,706 ยอดชม
2.ความนิยม	#กระทรวงมหาดไทย
	4,796 ยอดชม
3.ความนิยม	#กองสารนิเทศ ส.ป.ท.
	4,031 ยอดชม
4.ความนิยม	#มาตรการรับมือฤดูฝน
	2,275 ยอดชม
5.ความนิยม	#จ.ชัยภูมิ
	2,104 ยอดชม

นางบุญญาพร กายเพชร เกษตรอำเภอกันตัง กล่าวว่า ชาวสวนปาล์มในเขตจังหวัดภาคใต้ได้รับความเสียหายสูญเสียรายได้ จากต้นปาล์มยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยมีการระบาดของเชื้อรา กาโนเดอร์มา โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป หรือปาล์มที่ปลูกซ้ำแปลงเดิม

อาการของโรค

- ทางใบล่าง: มีสีซีดเหลือง แห้งตาย และหักพับห้อยลงมารอบลำต้น
- ทางยอด: ใบยอดใหม่คลี่ช้าหรือไม่คลี่ ต้นเติบโตช้า

- โคนต้น: เปลือกไม้บริเวณโคนต้นผุหรือกลวง ใช้ไม้เคาะจะมีเสียงโปร่งไม่แน่นทึบ

• ระยะลูกกลม: จะพบดอกเห็ดขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดงคล้ายเห็ดหลินจือขึ้นที่โคนต้นหรือราก ซึ่งเป็นระยะที่ปาล์มถูกทำลายรุนแรงแล้ว

การป้องกันและกำจัด

• ขุดทำลาย: ขุดโคนและขุดรากต้นปาล์มที่เป็นโรคออกให้หมด จากนั้นนำไปเผาทำลาย ห้ามเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปแปลงอื่น

- ฆ่าเชื้อในดิน: ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์บริเวณหลุมปลูกเดิมเพื่อปรับสภาพดินและฆ่าเชื้อรา

- จัดการแปลง: เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน เช่น ใส่ปุ๋ยหมัก หรือวางทางใบปาล์มตามแนวแถวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน

• ฝ้าระวัง: หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสวนปาล์มเก่าที่มีการปลูกใหม่ในรอบที่ 2 หรือ 3 ซึ่งมีความเสี่ยงสูง

ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย *Bacillus* sp. (B-Palm1) จะช่วยควบคุมและป้องกัน โรคลำต้นเน่าหรือโรคโคนเน่าในปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อรา *Ganoderma* (กาโนเดอร์มา)

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ จังหวัดตรัง เดือนชาวสวนปาล์ม ระวังโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

เกษตรอำเภอหนองไผ่
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ จังหวัดตรัง
ฉบับที่ 16 ปี 2569 วันที่ 25 กันยายน 2569

เกษตรอำเภอหนองไผ่
เดือนชาวสวนปาล์ม
ระวังโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

นางสาวรัชนิ นิลละออ เกษตรอำเภอหนองไผ่

เดือนชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ปลูกปาล์มในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ ในระยะต้นปาล์มน้ำมัน อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป หรือต้นอายุต่ำกว่า 10 ปี ปลุกชำแปลงเดิม ให้เฝ้าระวังการเกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน จากการเข้าทำลายของเชื้อรา กาโนเดอร์มา (*Ganoderma boninense*) เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศร้อน มีฝนตก และตกรากบางพื้นที่ ความชื้นสูงเหมาะต่อการระบาดของโรคได้

ลักษณะอาการ

- ใบมีสีซีดกว่าปกติและแห้ง ทางใบล่างหักพับทั้งตัว ห้อยลงรอบลำต้น ทางยอดที่ยังไม่แก่มีจำนวนมากกว่าปกติ
- ภายในลำต้นพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรค ลำต้นกลวงเนื้อเยื่อภายในฝืดเหนียว โคนต้นจะฟูเป็นโพรง หากลมพัดแรงหรือรับน้ำหนักผลผลิตไม่ได้ ทำให้ต้นล้ม บางต้นยืนต้นตาย
- เปลือกกรากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เนื้อเยื่อภายในกรากเปลี่ยนเป็นสีดำ ที่โคนต้นหรือรากบริเวณผิวต้นจะพบดอกเห็ด

แนวทางการป้องกันกำจัด ด้วยวิธีดังนี้

- ตรวจสอบต้นที่คาดว่าจะเปื้อนโรคโดยใช้ไม้เคาะลำต้น เพื่อฟังเสียงบริเวณโคนต้นที่ถูกทำลาย ซึ่งจะมีเสียงโป่ง ไม่แน่นทึบเหมือนต้นปกติ
- ตรวจสอบดอกเห็ดบริเวณโคนต้น และราก เป็นดอกที่โตขึ้นส่วนของเชื้อราสาเหตุโรคมักพบ ป่าไปทำลายนอกแปลงปลูก
- ขุดพบรอบ "ฯ" ต้นปาล์มน้ำมัน ที่เปื้อนโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปยังต้นปกติ
- ต้นที่มีอาการรุนแรง หรือตาย ให้ขุดถอนต้นออกให้ห่างจากแปลงปลูก
- สังเกตต้นที่ก่อปัญหาบริเวณใกล้เคียง ต้นที่เป็นโรค หากพบเริ่มมีอาการของโรคให้รีบป้องกันกำจัด
- บำรุงต้นปาล์มให้แข็งแรง โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 3-5 กก./ไร่ ในฤดูฝนควรเพิ่มปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 100-200 กก./ไร่
- เมื่อพบดอกเห็ดให้รีบขุดถอนไปทำลายทิ้งอย่าปล่อยให้ถูกทำลายออก หากพบเชื้อโรครายอื่นให้รีบกำจัดหรือใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรา
- รากหรือพุ่มบริเวณโคนต้นที่เปื้อนโรค และโคนต้นตายบางส่วน ควรใช้ยาป้องกันโรคโคนเน่า โรคมดน้ำ 1 กก. ต่อไร่ 20 - 100 ลิตร
- หากพบการเข้าทำลายแจ้งได้ที่
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อสม.)
หรือหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร
ประจำตำบล หนองไผ่
หรือโทร 075-299788
เพื่อขอรับการสำรวจและให้คำแนะนำต่อไป
- พื้นที่การปลูกต้นปาล์มที่พบโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน 5% ขึ้นไป ให้แจ้งหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล หนองไผ่
- แจ้งให้ทราบแก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าว/รายงาน : จรัสศรี แก้วดีประเสริฐ 076-290788 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 2569 <http://www.agriculture.go.th>

นางสาวรัชนิ นิลละออ เกษตรอำเภอหนองไผ่ เดือนชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ ระยะต้นปาล์มน้ำมัน อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป หรือต้นอายุต่ำกว่า 10 ปี ปลุกชำแปลงเดิม ให้เฝ้าระวังการเกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน จากการเข้าทำลายของเชื้อรา กาโนเดอร์มา (*Ganoderma boninense*) เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศร้อน มีฝนตก และตกรากบางพื้นที่ ความชื้นสูงเหมาะต่อการระบาดของโรคได้

ลักษณะอาการ

ใบมีสีซีดกว่าปกติและแห้ง ทางใบล่างหักพับทั้งตัว ห้อยลงรอบลำต้น ทางยอดที่ยังไม่แก่มีจำนวนมากกว่าปกติ ภายในลำต้นพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรค ลำต้นกลวงเนื้อเยื่อภายในฝืดเหนียว โคนต้นจะฟูเป็นโพรง หากลมพัดแรงหรือรับน้ำหนักผลผลิตไม่ได้ ทำให้ต้นล้ม บางต้นยืนต้นตาย เปลือกกรากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เนื้อเยื่อภายในกรากเปลี่ยนเป็นสีดำ ที่โคนต้นหรือรากบริเวณผิวต้นจะพบดอกเห็ด

แนวทางการป้องกันกำจัด ด้วยวิธีดังนี้

1. ตรวจสอบต้นที่คาดว่าจะเปื้อนโรคโดยใช้ไม้เคาะลำต้น เพื่อฟังเสียงบริเวณโคนต้นที่ถูกทำลาย ซึ่งจะมีเสียงโป่ง ไม่แน่นทึบเหมือนต้นปกติ

ปลูก

2. ตรวจหาดอกเห็ดบริเวณโคนต้นและราก เก็บดอกเห็ดซึ่งเป็นส่วนของเชื้อราสาเหตุโรคที่พบ นำไปทำลายนอกแปลง

3. ขุดหลุมรอบ ๆ ต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปยังต้นปกติ

4. ต้นที่มีอาการรุนแรง หรือตายให้ขุดล้อมต้นออกไปทำลายนอกแปลงปลูก

5. สังเกตต้นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต้นที่เป็นโรค หากพบเริ่มมีอาการของโรคให้รีบป้องกันกำจัด

6. บำรุงต้นปาล์มให้แข็งแรง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับเชื้อไตรโคเดอร์มา อัตรา เชื้อสด 1 กิโลกรัม รำละเอียด 4 - 10 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 50 - 100 กิโลกรัม หว่านรอบทรงพุ่ม 3-6 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงที่มีความชื้นสูง หรือรองกันหลุมก่อนปลูก 100 กรัมต่อหลุม

7. เมื่อพบดอกเห็ดเจริญเติบโตขึ้น ให้นำไปทำลายทั้งนอกแปลงทันที และถากเนื้อเยื่อที่ถูกลำลายออก ทาทับด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มา หรือใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรา

8. ราดหรือพ่นบริเวณรอบโคนต้นที่เกิดโรค และโดยรอบอย่างสม่ำเสมอด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มา โดยผสมเชื้อสด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 - 100 ลิตร

9. ต้นที่พบการติดเชื้อให้ฉีดสารป้องกันกำจัดโรคพืช เฮกซะโคนาโซล 5% SC ด้วยวิธี trunk pressure injection ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

10. แปลงที่มีการระบาดของโรค หากปลูกใหม่ควรใช้พันธุ์ต้านทานโรค

หากพบการเข้าทำลาย แจ้งได้ที่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ในทันที หรือโทร 075-299788 เพื่อลงพื้นที่สำรวจและให้คำแนะนำต่อไป



สำนักวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่

<https://radiochiangmai.prd.go.th/th/content/category/detail/id/57/iid/544956>

26 กันยายน 2569

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่พืชผัก ที่อำเภอฮอด ผสานวิถีวิถี - เกษตรปลอดภัย สร้างรายได้ ในพื้นที่อำเภอฮอด

25/09/2569 | 121 |

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่พืชผัก ที่อำเภอฮอด ผสานวิถีวิถี - เกษตรปลอดภัย สร้างรายได้ พัฒนาชุมชน

นายเสน่ห์ แสงคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นางสาวศรีโสภ ภาณุคำสือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก กลุ่ม “ผักค้อยโอเค” ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจุดเด่นของกลุ่ม คือ การรวมพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิด เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ากับนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับวัด โดยพระอาจารย์ฤทธิชัย ปณฺญาวศฺโณ พร้อมกลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ ตลอดจนต่อยอดจากการปลูกพืชผักไปสู่การปลูกกาแฟ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม นอกจากนี้ กลุ่มยังได้นำอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ลัวะมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านอาหาร วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่คนในชุมชน ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนได้อย่างใกล้ชิด

อำเภอฮอดมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 163,855 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ลำไย ข้าว และพืชผัก โดยกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต จากเดิมที่พึ่งพาสารเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม มาสู่การผลิตพืชผักที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต โดยตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูง โดยมีระดับความสูงประมาณ 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี และมีชุมชนชาติพันธุ์ลัวะซึ่งดำรงวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน ทั้งการตีเหล็กและทำมีดสับการทอผ้าและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ ถักย้อมลายทวน อาหารพื้นถิ่น เช่น พริกดำ ข้าวค้อยลัวะ ตลอดจนงานหัตถกรรมลูกบิดและสร้อยเดือยโก่ การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาการผลิตที่ปลอดภัย เชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรและชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการผลิตของกลุ่ม แปลงใหญ่ ได้ที่ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการกลุ่ม ตั้งอยู่บนถนนฮอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน หลักกิโลเมตรที่ 29 บนถนนหลวงหมายเลข 108 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-783-0289

พิมพ์ลักษณ์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ //// 25 ก.ย. 69

รูปภาพ

